

医学教育网初级护师：《答疑周刊》2019 年第 13 期

1. 【问题】老师化疗病人进食应该是什么时候？具体的前或者后几小时？

【解答】恶心、呕吐是化疗中常出现的反应之一，化疗前不可强迫进食，待化疗 2~3 小时后可减少食多餐，避免出现胃饱胀感；进食时不要多次饮水，最好在进食前后约一小时饮水。

2. 【问题】洋地黄的禁忌症是什么？

【解答】应用洋地黄类制剂的禁忌症：绝对禁忌症为：①洋地黄中毒；②洋地黄特异质反应。相对禁忌症为：

- ① 二度以上房室传导阻滞伴或不伴心力衰竭时，除非发生急性肺水肿时可慎用。
- ② 肥厚性梗阻型心肌病，洋地黄可导致左室流出道梗阻加重，若发生了快速的房性心律失常，特别是心房纤维性颤动，或伴有心力衰竭时，即可谨慎投以洋地黄类制剂。
- ③ 病态窦房结综合征。若安置人工起搏器后，心力衰竭仍持续存在，则可投用洋地黄类制剂。
- ④ 预激综合征并快速心房纤维性颤动者，可诱发心室颤动甚或猝死。

3. 【问题】8 个月小儿进行麻疹疫苗免疫接种后第二天，接种部位出现 3cm 红肿伴淋巴结轻度肿大，属于

- A. 局部反应阴性
- B. 局部中等反应
- C. 局部强反应
- D. 全身弱反应
- E. 全身中等反应

【解答】选择 B。此为预防接种后局部反应，红晕及硬结的直径在 2.5cm 以下者为弱反应，2.6~5cm 为中等反应，5cm 以上为强反应。

4. 【问题】小儿预防接种的口号。

【解答】出生乙肝卡介苗；2/3/4 月脊髓苗；3/4/5 月百白破；8 月麻疹一独苗。

5. 【问题】抗休克治疗中体现体表灌注情况的标志是

- A. 血压
- B. 心率
- C. 皮肤温度、色泽
- D. 尿量
- E. 脉率

答案为什么不是尿量？

【解答】皮肤温度、色泽：是体表灌流情况的标志。

尿量：是反映肾血液灌注情况的有效指标。

