

医学教育网中医执业助理医师《答疑周刊》2019 年第 13 期

**【针灸学】**

 医学教育网  
www.med66.com 下列输穴中，治疗便秘效果较好的是

- A. 关冲
- B. 中渚
- C. 阳池
- D. 支沟
- E. 外关



**学员提问：**为什么选 D？

**答案及解析：**本题答案为 D。

**【医学教育网原创】**支沟（TE6）经穴



**【定位】**在前臂后区，腕背侧远端横纹上 3 寸，尺骨与桡骨间隙中点。

**【主治】**①便秘；②耳鸣，耳聋，暴暗；③瘰疬；④胁肋疼痛；⑤热病。

 医学教育网  
www.med66.com 其他几个选项： 医学教育网  
www.med66.com 关冲**【主治】**①头痛、目赤、耳鸣、耳聋、喉痹、舌强等头面五官病证；  
②热病，心烦。


中渚**【主治】**①头痛、耳鸣、耳聋、目赤、喉痹等头面五官病证；②热病，消渴，疟疾；  
③肩背肘臂酸痛，手指不能屈伸。

阳池**【主治】**①目赤肿痛、耳聋、喉痹等五官病证；②消渴，口干；③腕痛，肩臂痛。

外关**【主治】**①热病；②头痛、目赤肿痛、耳鸣、耳聋等头面五官病证；③瘰疬，胁肋痛；④上肢痿痹不遂。

故本题答案选 D。

**【内科学】**

 医学教育网  
www.med66.com 男性，70 岁，既往有慢性肺心病病史 22 年，近日受凉后出现端坐呼吸、胸闷、气促伴咳嗽、咳痰，下列体征中有助于右心衰竭诊断的是



- A. 双肺底小水泡音
- B. 心尖区舒张期奔马律

 C. 心率 120 次 / 分  
www.med66.com

 医学教育网  
www.med66.com


- D. 交替脉
- E. 颈静脉怒张

 医学教育网  
www.med66.com

 医学教育网  
www.med66.com

**学员提问：**为什么选 E？

**答案及解析：**本题答案为 E。

 医学教育网  
www.med66.com

 医学教育网  
www.med66.com

**【医学教育网原创】**右心衰竭的典型体征之一就是：颈静脉怒张。

右心衰竭：心悸、呼吸困难及发绀进一步加重，出现上腹胀痛、食欲不振、少尿。主要体征为颈静脉怒张，肝肿大伴有触痛，肝颈静脉反流征阳性，下肢水肿，并可出现腹水。因右心室肥大使三尖瓣相对关闭不全，在三尖瓣区可听到收缩期杂音，严重者可出现舒张期奔马律，也可出现各种心律失常，以房性心律失常多见。病情严重者可发生休克。

 医学教育网  
www.med66.com

 医学教育网  
www.med66.com

故本题答案选 E。

### **【诊断学基础】**

内生肌酐清除率测定是反映

 医学教育网  
www.med66.com

 医学教育网  
www.med66.com


- A. 近端肾小管排泌功能
- B. 远端肾小管排泌功能
- C. 肾小球滤过功能
- D. 肾脏浓缩稀释功能
- E. 肾血流量

 医学教育网  
www.med66.com

 医学教育网  
www.med66.com

**学员提问：**为什么选 C？

**答案及解析：**本题答案为 C。

 医学教育网  
www.med66.com

 医学教育网  
www.med66.com

**【医学教育网原创】**内生肌酐清除率（Ccr）测定：Ccr 是指肾脏在单位时间内把若干毫升血浆中的内生肌酐全部清除出去。Ccr 是测定肾小球滤过功能最常用的方法，也是反映肾小球滤过功能的主要指标。

(1)判断肾小球损害的敏感指标 当 GFR 降低至正常值 50%时, Ccr 测定值可低至 50mL / min, 但血肌酐、血尿素氮测定仍可在正常范围内, 故 Ccr 能较早地反映 GFR。

(2)评估肾功能损害的程度 根据 Ccr 一般可将肾功能分为 4 期: ①肾衰竭代偿期: Ccr 51~80ml / min。②肾衰竭失代偿期: Ccr 50~20ml / min。③肾衰竭期 (尿毒症早期): Ccr 19~10ml / min。④肾衰竭终末期 (尿毒症晚期): Ccr <10ml / min。

(3)指导临床用药 Ccr 30~40ml / min 应限制蛋白质的摄入; Ccr 30ml / min, 用噻嗪类利尿剂无效, 改用祥利尿剂; Ccr ≤10mL / min, 祥利尿剂无效, 应做透析治疗。

故本题答案选 C。

### 【中医内科学】

虚劳与肺癆的鉴别要点主要在于

- A. 有无咳血盗汗
- B. 有无肺虚见证
- C. 有无五脏虚损证候
- D. 有无传染性
- E. 有无干咳

学员提问: 为什么选 D?

答案及解析: 本题答案选 D。

【医学教育网原创】肺癆是具有传染性的慢性虚弱疾患, 以咳嗽、咯血、潮热、盗汗及身体逐渐消瘦为主要临床特征。

故本题答案选 D。

### 【传染病学】

有关流行性出血热的描述正确的是

- A. 病人为主要传染源
- B. 热退后症状减轻
- C. 血小板常减少

- D. 外周血白细胞常减少
- E. 临床上都有五期经过

 **学员提问：**为什么选 C？  
www.med66.com

 **医学教育网**  
www.med66.com

**答案及解析：**本题选 C。

**【医学教育网原创】**流行性出血热血小板：从第 2 病日起开始减少，一般在  $(50\sim 80)\times 10^9/L$  左右，休克期与少尿期最低，并可见异型血小板。

 **医学教育网**  
www.med66.com

注意以下几点：流行性出血热以鼠类为主要传染源野。鼠型发病以秋冬季为多，家鼠型发病以春夏季为多。基本病理变化为全身小血管和毛细血管变性、坏死。

 **医学教育网**  
www.med66.com

故本题答案选 C。

 **医学教育网**  
www.med66.com

医学教育网中医执业助理医师：《答疑周刊》2019 年第 13 期（word 版下载）

 **医学教育网**  
www.med66.com

 **医学教育网**  
www.med66.com

 **医学教育网**  
www.med66.com

 **医学教育网**  
www.med66.com

 **医学教育网**  
www.med66.com

 **医学教育网**  
www.med66.com

 **医学教育网**  
www.med66.com

 **医学教育网**  
www.med66.com