

医学教育网初级护师：《答疑周刊》2019 年第 20 期

1. 【问题】产钳术的禁忌症与适应症是什么？

【解答】适应症：①同胎头吸引术。②臀位分娩后出头困难者。③胎头吸引术失败者。

禁忌证：①同胎头吸引术。②胎头骨质部的最低点在坐骨棘水平或以上，有明显头盆不称时。

③确定死胎、胎儿畸形者，应尽可能做穿颅术，以免损伤产道。

2. 【问题】白血病病人输入的是白细胞浓缩悬液还是新鲜血？

【解答】浓缩红细胞或全血。

新鲜血：指在 4℃ 的常用抗凝保养液中，保存 1 周之内的血。它基本保留了血液的所有成分，可以补充各种血细胞、凝血因子和血小板。适用于血液病病人。

白细胞浓缩悬液：新鲜全血经离心后取其白膜层的白细胞，4℃ 保存，48 小时内有效，用于粒细胞缺乏伴严重感染的病人。

(1) 纠正贫血：积极争取白血病缓解是纠正贫血最有效的方法。严重贫血可输注浓缩红细胞或全血。

(2) 控制出血：血小板计数过低者出血，输注浓缩血小板悬液是最有效的方法。若发生 DIC，应给予相应处理。

3. 【问题】主动脉骑跨是跨在哪两个地方？

【解答】主动脉骑跨是指：心脏的正常生理位置为右心室在前，左心室偏后，正常情况下血液由上腔静脉流入右心房——右心室——经由肺动脉流入肺脏进行气体交换——再由肺静脉流回左心房——左心室——泵入主动脉流向全身。

正常情况下由左心室发出，主动脉骑跨时向右前移位跨于两心室之上。常说的骑跨度即指主动脉骑跨右心室的程度。为右心室，即是室间隔，主动脉骑跨往往伴有室间隔缺损或移位，使骑跨程度更为严重。

在法洛氏四联症中，主动脉骑跨包括三种内容：

①主动脉瓣顺时针转位，较正常位置转向右侧；

②主动脉瓣右侧移位，比正常骑跨于右心室上较多。③圆锥室间隔向右前移位，所以主动脉起源于两心室，骑跨于室间隔缺损之上。如骑跨在 90% 以上，需作心内隧道，故在心血管外科中被列入右心室双出口范围内。

4. 【问题】痈初期红肿时，局部可涂以

A. 3% 过氧化氢

B. 75%酒精

C. 2%碘酊

D. 生理盐水

E. 碘伏

【解答】选择 C。疖初期只有红肿时，局部可涂以 2%碘酊。故选择 C。

5. 【问题】肝硬化形成门静脉高压的病理基础是什么？

【解答】肝硬化引起门脉高压原因：在肝硬化发展到一定阶段，肝细胞坏死，肝脏纤维化，形成肝细胞的再生结节，肝脏的原来结构逐渐破坏，使门静脉和肝静脉小血管闭塞、扭曲、减少、血流障碍，使从胃肠来的血液不能顺利通过肝脏。门静脉把胃肠道的血液回流到肝脏，肝脏把胃肠回流血带来的大量营养成分吸收和利用，然后再通过肝脏到达全身体循环。由于肝硬化，门静脉血回流减慢，大量的血液在胃肠道静脉里淤积，形成门脉高压。