

医学教育网初级护师：《答疑周刊》2019 年第 24 期

1. 【问题】小琴是新工作的护士，某日由于疏忽将 21 床庞某的液体输给了 27 床马某，紧急发现后给予了相关处理，核实药物为马某所共用，并未对患者造成不良影响。此行为属于

- A. 侵权行为
- B. 一级医疗事故
- C. 四级医疗事故
- D. 渎职罪
- E. 不属于医疗事故

【解答】选择 E。虽然存在过失行为，但没有造成损害后果，或虽存在损害后果，但医疗结构和医务人员没有过失行为，则都不属于医疗事故。

医疗事故的组成部分：主体是医疗机构及其医务人员，行为的违法性，过失造成患者人身损害。

过失造成患者人身损害：要有“人身损害”后果。这是判断是否是医疗事故至关重要的一点。题中护士虽然存在过失行为，但是并没有给患者造成损害后果，这种情况不应该被视为医疗事故。属于护理差错。

2. 【问题】何种腹腔内脏损伤检查时腹膜刺激征不明显

- A. 肝破裂
- B. 脾破裂
- C. 胰破裂
- D. 肠穿孔
- E. 胃穿孔

【解答】选择 B，完全性肝破裂表现为出血性休克，因血液、胆汁流入腹腔、腹膜刺激症较明显，有腹痛、腹肌紧张、压痛、反跳痛；有移动性浊音，肠鸣音消失，腹穿可抽出混有胆汁的血液。

3. 【问题】月经周期是怎么划分的？

【解答】1. 增生期 月经周期的第 5~14 天。在雌激素影响下，内膜很快修复，逐渐生长变厚，细胞增生。子宫内膜的增生与修复在月经期即已开始。

2. 分泌期 月经周期的第 15~28 天。排卵后，黄体分泌雌激素与孕激素，使子宫内膜在增生期的基础上，出现分泌期的变化，子宫内膜继续增厚，腺体增大，腺体内的分泌上皮细胞

分泌糖原，为孕卵着床做准备。

3. 月经期 约在月经周期的第 1~4 天。体内孕激素、雌激素水平降低，使内膜中前列腺的合成活化。前列腺刺激子宫肌层收缩，引起内膜螺旋小动脉开始阶段性和阵发性收缩、痉挛，组织缺血、缺氧而局灶性坏死，坏死的内膜剥落，表现为月经来潮。

4. 【问题】人际交往中的距离主要分为哪几区？

【解答】(1) 亲密区：指沟通双方距离小于 50cm，当护士在进行查体、治疗、安慰、爱抚时，与患者之间的距离。

(2) 个人区：指沟通双方距离在 50~100cm 之间，人们与亲友交谈、护士与病人进行交谈时主要使用此区距离。

(3) 社会区：指沟通双方距离在 1.1~4m 之间，在工作单位和社会活动时常用，如护士同事一起工作时或护士通知病人吃饭等。

(4) 公众区：指沟通双方距离在 4m 以上，一般用于正式公开讲话中，如上课、开会等。

5. 【问题】为什么二尖瓣狭窄晚期表现是右心室增大？

【解答】二尖瓣狭窄导致左心房的血液增多进而导致肺淤血，肺淤血严重者可导致右心室增大，由于右心室的血液增多没有办法进入肺而出现的右心室肥大。

