

医学教育网初级护师：《答疑周刊》2019 年第 27 期

1. 【问题】房颤与室颤的鉴别？

【解答】房颤与室颤的鉴别

	房颤	室颤
病因	风湿性心瓣膜病、甲亢等	急性心梗、洋地黄中毒等
临床表现	心室率 < 150 次/分，可有心悸、气促、心前区不适等； 心室率 > 150 次/分钟，心排出量 ↓ → 晕厥、肺水肿、心绞痛或休克； 持久性房颤 → 血栓 → 动脉栓塞； 听诊第一心音强弱不等，心律绝对不齐；可发生短绌脉	表现为迅速意识丧失、抽搐、发绀，继而呼吸停止，瞳孔散大甚至死亡； 查体心音消失、脉搏触不到，血压测不到
心电图	窦性 P 波消失，代之以大小形态及规律不一的 f 波，频率 350~600 次/分钟，QRS 波群形态正常，R-R 间隔完全不规则，心室率极不规则，常在 100~160 次/分	QRS 波群与 T 波消失，呈完全无规则的波浪状曲线，形状、频率、振幅高低各异
治疗	急性期首选电复律，合并心衰首选洋地黄	立即非同步电除颤

2. 【问题】不同颅骨骨折的特征表现？

【解答】(1) 颅前窝骨折：表现为眼睑青紫，眼结膜下出血，俗称“熊猫眼征”、“兔眼征”，鼻和口腔流血性脑脊液，可合并嗅神经和视神经损伤。

(2) 颅中窝骨折：在耳后乳突区皮下出现淤血。脑脊液漏从外耳道流出，如鼓膜未破，则可沿咽鼓管入鼻腔形成鼻漏；有时骨折累及蝶骨也会出现脑脊液鼻漏。可损伤面神经和听神经。

(3) 颅后窝骨折：在耳后及枕下部出现皮下瘀斑，脑脊液漏至胸锁乳突肌和乳突后皮下，偶有第 9~12 对脑神经损伤。

3. 【问题】当白细胞降到多少的时候应该停止化疗？

【解答】放疗中白细胞  $4 \times 10^9/L$  为警戒数，低于此数时，应考虑减少放射剂量。

白细胞低于  $3 \times 10^9/L$  时，应暂停治疗。

4. 【问题】慢性肾小球肾炎常见的尿液特点？和急性的一样吗？

【解答】急性肾小球肾炎，血尿常为患者起病的首发症状和就诊的原因。几乎所有病人均有肾小球源性血尿，约 30%出现肉眼血尿。尿液呈洗肉水样，一般于数天内消失，也可持续数周转为镜下血尿。

慢性肾小球肾炎，尿液检查 多为轻度尿异常。尿蛋白+~+++，24 小时尿蛋白定量常在 1~3g。尿中可有多形性的红细胞+~++、红细胞管型等。

5. 【问题】患者，男性，20 岁，车祸后大出血，测中心静脉压 3cmH<sub>2</sub>O，血压 80/60mmHg，心率 130 次/分，尿量 10ml/小时。为增加胶体渗透压及血容量，可选用的溶液是

- A. 羟乙基淀粉
- B. 低分子右旋糖酐
- C. 2%乳酸钠溶液
- D. 50%葡萄糖溶液
- E. 5%葡萄糖盐水

【解答】选择 A。代血浆：增加血浆渗透压及循环血量，常用羟乙基淀粉（706）、氧化聚明胶和聚维酮等溶液。可在急性大出血时与全血共用。

