

医学教育网初级护师:《答疑周刊》2020 年第 41 期

1. 【问题】足月儿与早产儿如何鉴别?

【解答】

	足月儿	早产儿
胎龄	≥37<42 周	≥28<37 周
出生体重	≥2500g≤4000g	<2500g
皮肤	红润, 皮下脂肪丰富, 胎毛少	绛红、水肿, 皮下脂肪少, 胎毛多
头发	分条清楚	纤细、绒毛状
耳壳	软骨发育好, 有弹性。耳舟清楚	缺乏软骨, 可折, 耳舟不清楚, 易贴颅骨
乳腺	可触及结节	无结节
指甲	过指端	未达指端
跖纹	遍及整个足底	仅足底前部有 1~2 条
外生殖器	大阴唇遮盖小阴唇, 睾丸下降	大阴唇不能遮盖小阴唇, 睾丸未下降

2. 【问题】新生儿特殊生理状态有哪些?

【解答】新生儿特殊生理状态

- (1) 生理性体重下降: 下降不超过 10%, 生后 10 日左右恢复。
- (2) 生理性黄疸: 生后 2~3 日出现, 4~5 日最重, 2 周内消退。
- (3) 生理性乳腺肿大: 乳腺内有蚕豆到鸽蛋大小的肿块, 多于 2~3 周消退。
- (4) 假月经: 部分女婴生后 5~7 日, 阴道流出少量血液, 持续约 1 周, 不必处理。
- (5) “板牙”、“马牙”: 新生儿上颌中线和齿龈切缘上有黄白色小斑点, 不需处理。

新生儿面颊部的脂肪垫俗称“螳螂嘴”, 对吸乳有利, 不应挑、割, 以免发生感染。

3. 【问题】烧伤面积如何计算?

【解答】成人体表面积中国九分法

部位	成人各部位面积 (%)	小儿各部位面积 (%)
头颈	9×1=9 (发部 3 面部 3 颈部 3)	9+ (12-年龄)
双上肢	9×2=18 (双手 5 双前臂 6 双上臂 7)	9×2
躯干	9×3=27 (腹侧 13 背侧 13 会阴 1)	9×3

双下肢	$9 \times 5 + 1 = 46$ (双臀 5 双大腿 21 双小腿 13 双足 7)	$46 - (12 - \text{年龄})$
-----	---	-------------------------

注：烧伤面积可简单归纳为：三三三，五六七；十三，十三，二十一；双臀占五会阴一；小腿十三双足七。

4. 【问题】肋骨骨折的好发部位是哪里？

【解答】肋骨骨折的好发部位为：第 4~7 肋骨。

5. 【问题】多根、多处骨折特征性表现是什么？

【解答】多根、多处骨折会出现反常呼吸运动。

(1) 吸气时，胸腔内负压增高，软化区向内凹陷。

(2) 呼气时，胸腔内负压减低，该部胸壁向外凸出，又称连枷胸。