

中医儿科学

主讲：姜逸

1. 婴儿期是指

- A. 从 1 周岁至满 3 周岁
- B. 从出生后至满 1 周岁
- C. 从出生后脐带结扎到出生后 28 天
- D. 从 3 周岁后到入小学前（6~7 岁）
- E. 从 6~7 周岁入小学至青春期来临

2. A. 新生儿期

B. 婴儿期

C. 幼儿期

D. 学龄前期

E. 学龄期

小儿生长发育最快的时期是

容易发生肺系疾病、脾系疾病及各种传染病的时期是
、B

3. 按照公式计算，3 岁小儿的标准身高、体重分别是

- A. 12kg, 91cm
- B. 12kg, 98cm
- C. 14kg, 96cm
- D. 14kg, 98cm
- E. 16kg, 91cm

4. 小儿前囟闭合的正常时间是

- A. 1~3 个月
- B. 3~6 个月
- C. 6~12 个月
- D. 12~18 个月
- E. 18~24 个月

5. 1 岁儿童的身长、头围平均是

- A. 身长 46cm, 头围 32cm
- B. 身长 75cm, 头围 46cm
- C. 身长 40cm, 头围 30cm
- D. 身长 42cm, 头围 31cm
- E. 身长 50cm, 头围 32cm

6. A. 33-34cm

B. 46cm

C. 48cm

D. 50cm

E. 54cm

新生儿的头围是

5 岁小儿的胸围是
、E

7. 小儿出齐 20 颗乳牙的时间是

- A. 8—10 个月
- B. 11—12 个月
- C. 13—15 个月
- D. 16—19 个月
- E. 24—30 个月

8. 随着小儿年龄的增加

- A. 脉搏增快，血压增高
- B. 脉搏增快，血压减低
- C. 脉搏减慢，血压增高
- D. 脉搏减慢，血压减低
- E. 脉搏、血压均无明显变化

9. A. 40~30 次/分

B. 45~40 次/分

C. 60~50 次/分

D. 80~60 次/分

E. 90~70 次/分

新生儿正常呼吸频率是

8 岁小儿正常脉搏频率是

、E

年龄	呼吸（次）	脉搏（次）	呼吸：脉搏
新生儿	45—40	140—120	1:3
≤1 岁	40—30	130—110	1: (3—4)
⁺ 1—3 岁	30—25	120—100	1: (3—4)
⁺ 3—7 岁	25—20	100—80	1:4
⁺ 7—14 岁	20—18	90—70	1:4

10. 按公式计算，正常 5 岁小儿的收缩压是

A. 70mmHg

B. 80mmHg

C. 90mmHg

D. 100mmHg

E. 110mmHg

11. 小儿能独走的时间一般是

A. 8 个月

B. 10 个月

C. 12 个月

D. 16 个月

E. 18 个月

12. 下列各项，符合小儿“纯阳”理论的是

A. 生机蓬勃

B. 脏腑娇嫩

C. 有阳无阴

D. 阳亢阴亏

E. 形气未充

13. 小儿“稚阴稚阳”学说，是指其生理状态为

A. 阳常有余，阴常不足

B. 脏腑娇嫩，形气未充

C. 生机蓬勃，发育迅速

D. 脏气清灵，易趋康复

E. 脾常不足，肝常有余

14. 小儿疾病谱中最为多见的是

A. 肺肾系病证

B. 心肺系病证

C. 肺脾系病证

D. 心肝系病证

E. 肝肾系病证

15. 小儿患病后易趋康复的主要原因是

A. 心常有余

B. 肝常有余

C. 稚阴稚阳

D. 脏腑已成

E. 脏气清灵

16. A. 不易发病，传变迅速

B. 发病容易，传变迅速

C. 脏腑娇嫩，形气未充

D. 发病容易，传变较缓

E. 脏气清灵，传变迅速

小儿生理特点是

小儿病理特点是

、B

17. 小儿望诊最重要的内容是

A. 望神色

B. 望形态

C. 审苗窍

D. 察指纹

E. 察斑疹

18. 小儿面呈红色，证候多属

- A. 热
- B. 湿
- C. 燥
- D. 虚
- E. 实

19. 小儿惊痫多呈现的面色是

- A. 白
- B. 红
- C. 黄
- D. 青
- E. 黑

20. 咽部有灰白色假膜，轻拭不去，重擦出血，白膜复生，可见于

- A. 鹅口疮
- B. 白喉
- C. 乳蛾
- D. 麻疹黏膜斑
- E. 口疮

21. 小儿正常舌质的颜色是

- A. 淡白
- B. 淡红
- C. 紫暗
- D. 暗红
- E. 绛红

22. A. 滑润舌

- B. 红绛舌
- C. 地图舌
- D. 霉酱舌
- E. 草莓舌

丹痧的典型舌象是

胃之气阴不足的典型舌象是

、C

23. 患儿，10 个月。大便呈果酱色，伴阵发性哭吵，腹胀。其诊断是

- A. 痢疾
- B. 肠炎
- C. 积滞
- D. 虫积
- E. 肠套叠

24. 小儿“地图舌”是由于

- A. 肺气虚弱
- B. 脾阳亏虚
- C. 脾失健运
- D. 宿食内停
- E. 胃之气阴不足

25. 小儿指纹分三关，从虎口到食指端依次为

- A. 命关、气关、风关
- B. 气关、命关、风关
- C. 气关、风关、命关
- D. 风关、气关、命关
- E. 风关、命关、气关

26. 正常小儿的指纹是

- A. 淡紫隐隐不超出风关
- B. 淡紫隐隐不超出气关
- C. 淡紫隐隐不超出命关
- D. 暗紫不超出气关
- E. 紫红不超出命关

27. 下列各项，不属小儿指纹辨证纲领的是

- A. 淡滞定虚实
- B. 三关测轻重
- C. 浮沉分表里
- D. 红紫辨寒热
- E. 纹证不符，舍证从纹

28. 患儿，1岁。轻咳流涕，伴有喷嚏，心肺正常，指纹淡紫于风关。其病情判断是

- A. 邪浅病轻
- B. 病情较重
- C. 邪入气营
- D. 病情凶险
- E. 病邪入里

29. 小儿指纹淡红，其证候是

- A. 虚寒
- B. 食积
- C. 痰热
- D. 虚热
- E. 实热

30. 邪热郁滞的指纹色是

- A. 深紫
- B. 紫红
- C. 青紫
- D. 淡红
- E. 鲜红浮露

31. 小儿哭声绵长，口作吮乳状，多为.

- A. 饥饿
- B. 口疮
- C. 腹痛
- D. 咽喉水肿
- E. 尿布潮湿不适

32. 儿科的基本脉象为

- A. 浮、沉、缓、急、虚、实
- B. 浮、沉、迟、数、滑、涩
- C. 浮、沉、迟、数、有力、无力
- D. 浮、沉、缓、急、有力、无力
- E. 浮、沉、迟、数、长、短

33. A. 干咳无痰，咳声响亮

- B. 咳嗽气促，喉间哮鸣
- C. 咳声嘶哑，声如犬吠
- D. 连声咳嗽，伴鸡鸣样回声
- E. 咳嗽痰鸣，气促鼻煽

急喉风的咳嗽特点是

顿咳的咳嗽特点是

、D

34. A. 胎产史

- B. 喂养史
- C. 生长发育史
- D. 预防接种史
- E. 家族史

当小儿出现脾胃病时，应特别注意询问的是

需要与传染病鉴别时，应特别注意询问的是

、D

35. 下列小儿疾病，不宜用推拿手法治疗的是

- A. 厌食
- B. 咳嗽
- C. 紫癜
- D. 腹痛
- E. 遗尿

36. A. 囟门隆起

- B. 凶门迟闭
C. 凶门早闭
D. 凶门凹陷
E. 凶门宽大，骨缝裂解
- 佝偻病的常见体征是
脑积水（解颅）的常见体征是
、 E

37. A. 沉而有力
B. 数而有力
C. 数而无力
D. 浮而无力
E. 迟而有力
- 小儿实热证的脉象是
小儿虚热证的脉象是
、 C

38. A. 浮而无力
B. 沉而有力
C. 迟而有力
D. 迟而无力
E. 浮而有力
- 小儿表实证的脉象是
小儿表虚证的脉象是
、 A

39. A. 头颅
B. 胸胁
C. 腹部
D. 皮肤
E. 四肢
- 小儿水肿，按诊的主要部位是
婴儿颅内压增高，按诊的主要部位是
、 A

40. A. 麻疹
B. 口疮
C. 风疹
D. 猩红热
E. 流行性腮腺炎
- 草莓舌见于
患儿哭叫拒食，伴流涎烦躁见于
、 B

41. A. 干咳无痰或痰少黏稠
B. 咳声嘶哑如犬吠状
C. 咳声清亮，鼻塞声重
D. 咳嗽频频，痰稠难咯，喉中痰鸣
E. 连声咳嗽，夜咳为主，咳而呕吐，伴鸡鸣样回声

白喉的临床特点
顿咳的临床特点

、E

42. 下列除哪项外，均可使用培元补肾法

- A. 解颅
- B. 五迟
- C. 五软
- D. 哮喘
- E. 肺炎喘嗽

43. 常用敷贴法治疗的小儿疾病是

- A. 水肿
- B. 哮喘
- C. 紫癜
- D. 惊厥
- E. 癫痫

44. 下列小儿疾病，不宜用推拿手法治疗的是

- A. 厌食
- B. 紫癜
- C. 咳嗽
- D. 腹痛
- E. 遗尿

45. 新生儿在上腭中线和齿龈部位有散在黄白色、碎米粒样颗粒，为

- A. 马牙
- B. 板牙
- C. 螳螂子
- D. 口疮
- E. 鹅口疮

46. 下列各项，属于新生儿病态的是

- A. 马牙
- B. 胎怯
- C. 螳螂子
- D. 女婴生后 3~5 天乳房隆起如蚕豆到鸽蛋大小，2~3 周消退
- E. 女婴生后 5~7 天阴道有少量流血，1~3 天自止

47. 母乳喂养的原则是

- A. 昼夜均喂
- B. 定次喂给
- C. 定量喂给
- D. 按需喂给
- E. 按时喂给

48. 下列关于母乳喂养的叙述，正确的是

- A. 母乳中的酪蛋白多，易于消化吸收
- B. 目前主张正常足月新生儿的开奶时间应为出生后 6h
- C. 1 岁半~2 岁可完全断奶
- D. 每次哺乳时间为 30 分钟
- E. 乳母患活动性肺结核、急性肝炎时禁忌哺乳

49. 小儿断奶时间宜在

- A. 2~3 个月
- B. 4~5 个月
- C. 6~7 个月
- D. 12 个月左右
- E. 13~18 个月

50. 小儿添加辅食的时间大约是

- A. 4—6 个月
- B. 6—8 个月
- C. 8—12 个月
- D. 1 岁以上
- E. 两岁以上

51. 辅助食品的添加原则错误的是

- A. 从少到多
- B. 由稠到稀
- C. 由一种到多种
- D. 由细到粗
- E. 天气炎热和婴儿患病时，应暂缓添加新品种

52. 孕期 36 周早产，新生儿出生 10 天，体短形瘦，头大凶张，头发稀黄，耳壳软，哭声低微，肌肤不温，指甲软短，骨弱肢柔，指纹淡。其证候是

- A. 肾精薄弱证
- B. 脾胃气虚证
- C. 脾胃阴虚证
- D. 脾肾两虚证
- E. 脾胃虚寒证

53. 患儿，出生 7 天。足月顺产。啼哭无力，多卧少动，肌肉瘠薄，四肢不温，吮乳乏力，呛乳溢乳，哽气多哕，腹胀腹泻，指纹淡。治疗应首选的方剂是

- A. 保元汤
- B. 生脉饮
- C. 六味地黄汤
- D. 补肾地黄汤
- E. 金匮肾气丸

54. 以下各项，不属硬肿症病因的是

- A. 胎禀不足
- B. 阳气虚弱
- C. 保暖不当
- D. 复感寒邪
- E. 喂养不当

55. 小儿硬肿症寒凝血涩，治法是

- A. 温经散寒，活血通络
- B. 益气温阳，通经活血
- C. 健脾益肾，温运脾阳
- D. 温中化湿，理气健脾
- E. 疏风散寒，化湿和中

56. 治疗硬肿症寒凝血涩证，应首选的方剂是

- A. 四逆汤
- B. 参附汤
- C. 金匮肾气丸
- D. 当归四逆汤
- E. 血府逐瘀汤

57. 患儿，出生 8 天。出生时体重 2000g，啼声细弱无力，全身冰冷，僵卧少动，面色苍白，肌肉板硬而肿，硬肿范围达 60%，皮肤暗红，少尿，指纹色红不显。其治法是

- A. 益气养心，活血化瘀
- B. 通经活络，利水消肿
- C. 益气温阳，通经活血
- D. 益气温阳，利水消肿
- E. 温经散寒，益气活血

58. 下列属于早产儿生理性黄疸特点的是

- A. 生后 5—6 天出现，30—35 天完全消退
- B. 生后 3—4 天出现，21—28 天完全消退
- C. 生后 3—4 天出现，15—20 天完全消退
- D. 生后 2—3 天出现，10—14 天完全消退
- E. 生后 1—2 天出现，3—7 天完全消退

59. 生理性胎黄的特点是

- A. 黄疸常于生后 2—3 天出现
- B. 黄疸常于生后 1 周内消退
- C. 早产儿黄疸轻，消退早
- D. 早产儿 24 小时内出现黄疸
- E. 早产儿与足月儿无明显差别

60. 下列除哪项外，均属病理性胎黄

- A. 生后 24 小时内出现
- B. 黄疸 10~14 天左右消退
- C. 黄疸退而复现
- D. 黄疸持续加深
- E. 黄疸 3 周后仍不消退

61. A. 生理性黄疸

- B. 溶血性黄疸
- C. 母乳性黄疸
- D. 阻塞性黄疸
- E. 新生儿感染性黄疸

小儿出生后 24 小时内出现黄疸并迅速加重，伴贫血及肝脾肿大，应首先考虑的诊断是
小儿出生后第 2—3 天出现黄疸，第 4—6 天达高峰，2 周消退，应首先考虑的诊断是
、A

62. 胎黄寒湿阻滞证的颜色特点是

- A. 面目皮肤发黄，色泽鲜明
- B. 面目皮肤发黄，色泽晦暗
- C. 面目皮肤发黄，颜色如橘皮
- D. 面目皮肤萎黄
- E. 面目皮肤发黄如褐色

63. 足月男婴，23 天。出生后 2 周出现身黄，目黄，黄色鲜明，发热口渴，或见心中懊恼，腹部胀闷，口干而苦，恶心呕吐，小便短少黄赤，大便秘结，舌苔黄腻，脉象弦数。治疗应首先考虑的方剂是

- A. 茵陈蒿汤加减
- B. 大柴胡汤加减
- C. 茵陈术附汤加减
- D. 茵陈理中汤加减
- E. 茵陈四逆汤加减

64. 患儿，出生后 26 天，面目皮肤发黄，色泽鲜明如橘，不欲吮乳，大便秘结，小便深黄，舌质红，苔黄腻。其治法是

- A. 健脾利湿
- B. 温中化湿
- C. 温阳固脱
- D. 化痰消积
- E. 清热利湿

65. 患儿，男。出生后黄疸日久不退，面目皮肤发黄，颜色晦滞，腹部胀满，右肋下痞块，小便短黄，大便不调，舌紫暗，有瘀斑，苔黄。治疗应首选

- A. 血府逐瘀汤
- B. 茵陈理中汤
- C. 茵陈蒿汤

- D. 茵陈五苓散
E. 茵陈术附汤

66. 足月女婴，25 天，出生后 2 周出现身黄，目黄，其色晦暗，持续不退，精神倦怠，四肢欠温，不欲吮乳，大便溏薄，小便短少，舌质偏淡，舌苔白腻。治疗应首先考虑的方剂是

- A. 茵陈理中汤
B. 茵陈蒿汤
C. 血府逐瘀汤
D. 茵陈四苓汤
E. 茵陈四逆汤

67. 小儿风热感冒的治法是

- A. 辛温解表
B. 清热利湿
C. 清暑解表
D. 清热解毒
E. 辛凉解表

68. 导致小儿感冒夹痰的生理特点是

- A. 肺常不足
B. 脾常不足
C. 心常有余
D. 肝气未盛
E. 肾常虚

69. 患儿，2 岁，发热 3 天，恶寒，有汗，头痛，面红目赤，流黄涕，咽红肿，咳痰黄稠，口干喜饮，烦躁不宁，脘腹胀满，不思乳食，呕吐酸腐，大便酸臭，每日 3 次，口气臭秽，舌红，苔黄厚腻，指纹淡紫。治疗应首选的方剂是

- A. 银翘散合白虎汤
B. 黄连解毒汤
C. 桑菊饮合白虎汤
D. 荆防败毒散
E. 银翘散合保和丸

70. 患儿，4 岁，发热 2 天，低热，恶寒，无汗，鼻塞流涕，咳嗽较剧，痰多，痰白清稀，舌红，苔薄白，其治疗在疏风解表的基础上，应加用的方剂是

- A. 桑菊饮
B. 三拗汤
C. 桑杏汤
D. 桑白皮汤
E. 麻杏石甘汤

71. 患儿，9 个月。发热，微汗，鼻塞流涕，咽红，夜间体温升高，又见惊惕啼叫，夜卧不安，舌质红，苔薄白，指纹浮紫。其诊断是

- A. 夜啼
- B. 感冒夹痰
- C. 感冒夹惊
- D. 急惊风
- E. 小儿暑温

72. 患儿，6岁。喉核赤肿，咽喉疼痛，吞咽不利，发热重，鼻塞流涕，头痛身痛，舌红，苔薄黄，脉浮数。应首选的方剂是

- A. 银翘马勃散
- B. 牛蒡甘桔汤
- C. 养阴清肺汤
- D. 普济消毒饮
- E. 荆防败毒散

73. 咳嗽痰多，色黄粘稠，难以咳出，喉中痰鸣的证候是

- A. 风寒咳嗽
- B. 风热咳嗽
- C. 痰热咳嗽
- D. 痰湿咳嗽
- E. 气虚咳嗽

74. 治疗风寒咳嗽，应首选的方剂是

- A. 麻黄汤
- B. 桂枝汤
- C. 二陈汤
- D. 金沸草散
- E. 小青龙汤

75. 2岁幼儿，咳嗽频作、声重，咽痒，痰白清稀，鼻塞流涕，恶寒无汗，发热头痛，全身酸痛，舌苔薄白，脉浮紧。治法是

- A. 疏风清热，散结止痛
- B. 清热解毒，软坚止痛
- C. 清热解毒，开窍止痛
- D. 疏风散寒，宣肺止咳
- E. 清热解毒，息风开窍

76. 患儿，男，8个月，反复咳嗽痰多，色黄粘稠，喉中痰鸣，大便干结，小便黄少，舌红，苔黄腻，指纹紫，其辨证是

- A. 痰热咳嗽
- B. 风热咳嗽
- C. 风热郁肺证
- D. 痰湿咳嗽
- E. 痰热闭肺证

77. 患儿，2 岁。咳嗽 2 天，咳声不爽，痰黄黏稠，口渴咽痛，鼻流浊涕，伴发热、恶心、头痛、微汗出，舌红苔薄黄，脉浮数。其证候是

- A. 风寒咳嗽
- B. 风热咳嗽
- C. 痰热咳嗽
- D. 痰湿咳嗽
- E. 阴虚燥咳

(1—3 题共用题干)

78. 患儿，女，9 个月，1 个月前患肺炎一直未愈，现干咳少痰，微喘，低热盗汗，口唇干燥，大便干燥，舌红苔花剥，指纹淡紫，显于气关。

(1) 其辨证是

- A. 肺脾阴虚证
- B. 营卫失调证
- C. 肺肾阴虚证
- D. 肺脾气虚证
- E. 阴虚肺热证

(2) 其治法是

- A. 养阴润肺，益气健脾
- B. 调和营卫，益气固表
- C. 养阴清热，敛肺补肾
- D. 养阴清肺，润肺止咳
- E. 补肺益气，健脾化痰

(3) 治疗应首选的方剂是

- A. 生脉散
- B. 沙参麦冬汤
- C. 麦冬地黄丸
- D. 人参五味子汤
- E. 黄芪桂枝五物汤

79. 患儿，10 岁，高热咳嗽 4 天，现咳嗽剧烈，高热持续，烦躁气急，鼻煽，涕泪俱无，舌红而干，舌苔黄腻，脉洪数。治疗首选方

- A. 白虎汤合桑白皮汤
- B. 银翘散合麻杏石甘汤
- C. 黄连解毒汤合麻杏石甘汤
- D. 麻杏石甘汤合葶苈大枣泻肺汤
- E. 射干麻黄汤合葶苈大枣泻肺汤

80. 患儿，1 岁 10 个月，咳嗽 1 周，发热伴气促 1 天，症见精神萎靡，面色苍白，口唇发绀，呼吸 64 次/分，心率 186 次/分，大汗淋漓，四肢厥冷，肋下痞块，舌淡紫，苔薄白，指纹青紫，给予口服地高辛治疗的计量是

- A. 0.02—0.04mg/kg

- B. 0.04—0.06mg/kg
- C. 0.06—0.08mg/kg
- D. 0.08—0.10mg/kg
- E. 0.10—0.12mg/kg

81. 哮喘与肺炎喘嗽的主要区别是

- A. 咳嗽气喘
- B. 痰壅
- C. 气急
- D. 鼻煽
- E. 哮鸣，呼气延长

82. 哮喘痰热阻肺证的治法是

- A. 温肺散寒，化痰定喘
- B. 清热宣肺，止咳化痰
- C. 清肺涤痰，止咳平喘
- D. 解表清里，定喘止咳
- E. 泻肺补肾，标本兼顾

83. 治疗哮喘风寒束肺证，应首选的方剂是

- A. 玉屏风散合都气丸
- B. 大青龙汤合定喘汤
- C. 麻杏石甘汤合苏葶丸
- D. 射干麻黄汤合二陈汤
- E. 小青龙汤合三子养亲汤

84. 患儿，男，5岁，反复咳喘1年，再发1天。反复咳喘，每因天气变化受凉诱发，昨日起咳嗽，气促，呼气延长，喉间哮鸣，唇周轻度发绀，喷嚏鼻塞，流清涕，形寒肢冷，无汗，口不渴，咽不红，舌淡红，苔薄白，脉浮，其治法是

- A. 清肺涤痰，止咳平喘
- B. 温肺散寒，涤痰定喘
- C. 解表清里，止咳定喘
- D. 清肺平喘，补肾纳气
- E. 辛温解表，化痰止咳

85. 患儿，10岁。昨天受凉后，见喷嚏、鼻塞、流清涕，今晨起喘咳，咳痰稠黄，口渴欲饮，大便干燥。查体：鼻煽，口周发绀，咽红，双肺满布哮鸣音，舌质红，苔薄白，脉滑数。其证候是

- A. 寒性哮喘
- B. 热性哮喘
- C. 外寒内热
- D. 肺实肾虚
- E. 肺肾阴虚

86. 下列各项，不属于小儿反复呼吸道感染外因的是

- A. 喂养不当
- B. 调护失宜
- C. 用药不当
- D. 疾病所伤
- E. 肺脾肾三脏功能不足

87. 患儿，9岁。反复呼吸道感染，诉恶风、恶寒，面色少华，四肢不温，多汗易汗，舌淡红，苔薄白，脉无力。其证候是

- A. 肺脾气虚
- B. 营卫失调
- C. 脾肾两虚
- D. 肺脾阴虚
- E. 气阴两虚

88. 治疗鹅口疮心脾积热证，应首选的方剂是

- A. 银翘散
- B. 泻白散
- C. 泻心导赤散
- D. 清热泻脾散
- E. 知柏地黄丸

89. 银翘散治疗口疮的证候是

- A. 心脾积热证
- B. 胃火炽盛证
- C. 心火上炎证
- D. 肝胆火旺证
- E. 风热乘脾证

90. 患儿，1岁。昨起舌上溃破，色红疼痛，进食哭闹，心烦不安，口干欲饮，小便短赤。治疗应首选

- A. 凉膈散
- B. 泻心导赤汤
- C. 清胃散
- D. 泻心汤
- E. 六味地黄丸

91. 小儿泄泻的好发年龄是

- A. 2 周岁以内
- B. 2 周岁—3 周岁
- C. 4 周岁—6 周岁
- D. 7 周岁—9 周岁
- E. 9 周岁以上

92. 不属于脾虚泻粪便特点的是

- A. 大便稀溏
- B. 大便色淡
- C. 臭味不甚
- D. 食后作泻
- E. 大便中多黏液

93. 患儿，女，8个月。腹泻4天，每日泻下近10次，泻下急迫，质稀如水，色黄臭秽，肛门灼热，小便黄短，伴发热，舌质红，苔薄白，指纹紫。目前最容易出现的变证是

- A. 邪陷厥阴证
- B. 气阴两伤证
- C. 阴竭阳脱证
- D. 虚阳外越证
- E. 内闭外脱证

94. 患儿，11个月。泄泻2周。起病时每日泻10多次，经治疗大减，但近日仍日行3-4次，大便稀溏色淡，每于食后作泻，面色萎黄，神疲倦怠，舌质淡，苔薄白。其证候是

- A. 风寒
- B. 湿热
- C. 伤食
- D. 脾虚
- E. 脾肾阳虚

95. 患儿，2岁，起病1天，大便如蛋花汤样，日行10余次，泻下急迫，气味秽臭，恶心，呕吐，腹痛时作，小便短黄，舌质红，苔黄腻。其证候是

- A. 伤食泻
- B. 湿热泻
- C. 风寒泻
- D. 脾虚泻
- E. 脾肾阳虚泻

96. 参苓白术散治疗小儿泄泻的证候是

- A. 风寒泻
- B. 湿热泻
- C. 伤食泻
- D. 脾虚泻
- E. 脾肾阳虚泻

97. 患儿，10个月，泄泻2天，日10余次，质稀如水，量多，烦躁不安，囟门凹陷，皮肤干燥，啼哭泪少，小便短少，舌红少津，指纹紫，其治法是

- A. 健脾益气，涩肠止泻
- B. 温补脾肾，固涩止泻
- C. 健脾利湿，固涩止泻
- D. 健脾益气，酸甘敛阴

E. 挽阴回阳，救逆固脱

98. 腹痛总的治疗原则是

- A. 温中散寒，理气止痛
- B. 通腑泄热，行气止痛
- C. 温中理脾，缓急止痛
- D. 调理气机，和中缓急
- E. 活血化瘀，行气止痛

99. 小儿 6 岁，近一周腹痛绵绵，时作时止，痛处喜按，得温则舒，面白少华，精神倦怠，手足清冷，乳食减少，食后腹胀，大便稀溏，舌淡苔白，脉沉缓，指纹淡红，治疗当选

- A. 小建中汤合理中丸
- B. 少腹逐瘀汤
- C. 大承气汤
- D. 养脏汤
- E. 香砂平胃散

100. 小儿便秘，当首辨

- A. 寒热
- B. 气血
- C. 阴阳
- D. 表里
- E. 虚实

101. A. 枳实导滞丸

- B. 麻子仁丸
- C. 六磨汤
- D. 黄芪汤
- E. 润肠丸

小儿便秘血虚证

小儿便秘燥热证

、B

102. 患儿，5 岁，不思进食 2 月余，食少饮多，皮肤失润，大便偏干，小便短黄。舌红少津，苔花剥，脉细数。治疗应首选的方剂是

- A. 生脉散
- B. 养胃增液汤
- C. 六味地黄汤
- D. 增液承气汤
- E. 养阴清胃汤

103. 患者，男，3 岁。长期食欲不振，厌恶进食，多食后则脘腹饱胀，形体尚可，大便溏，舌淡红，苔薄白，脉有力，其辨证是

- A. 脾失健运证
- B. 脾胃气虚证

- C. 脾胃阴虚证
- D. 脾胃不和证
- E. 心脾两虚证

104. 小儿厌食脾失健运证的治法是

- A. 调和脾胃，运脾开胃
- B. 健脾益气，佐以温中
- C. 滋脾养胃，佐以助运
- D. 运脾化湿，消积开胃
- E. 补脾开胃，消食助运

105. A. 厌恶进食，多食饱胀，精神尚可

- B. 不欲饮食，脘腹胀满，烦躁多啼
- C. 不思进食，食而不化，形瘦肢倦
- D. 不思进食，食少饮多，便干烦躁
- E. 食欲不振，大便稀溏，完谷不化

厌食脾胃气虚证证见

厌食脾胃阴虚证证见

、D

106. 患儿，10 个月。近半个月不思乳食，脘腹胀满，疼痛拒按，呕吐酸馊，烦躁哭吵，大便较干，臭秽，舌淡苔白腻。其诊断是

- A. 厌食
- B. 腹痛
- C. 疳证
- D. 积滞
- E. 呕吐

107. 患儿，3 岁。面色萎黄，困倦乏力，不思乳食，食则饱胀，呕吐酸馊，大便溏薄酸臭。其治法是

- A. 消乳消食，和中导滞
- B. 健脾和胃，消食导滞
- C. 和脾助运，降逆止呕
- D. 补土抑木，消食导滞
- E. 健脾助运，消食化滞

108. 疳证的基本病理改变为

- A. 脾胃虚弱，运化失健
- B. 脾胃虚弱，乳食停滞
- C. 脾失运化，水湿内停
- D. 脾胃不和，生化乏源
- E. 脾胃受损，津液消亡

109. 疳积证的治法是

- A. 调脾健运

- B. 消积理脾
- C. 益气健脾
- D. 运脾理气
- E. 补益气血

110. 下列各项，不属疳气证临床表现的是

- A. 精神欠佳
- B. 形体略瘦
- C. 不思饮食
- D. 大便干稀不调
- E. 面貌如老人

111. 患儿，2岁，易发腹泻，现体重9.5kg，面色少华，毛发稀疏，不思饮食，急躁易怒，大便稀溏，舌淡红，苔薄白，指纹淡红，其诊断是

- A. 厌食，脾胃气虚证
- B. 积滞，脾虚夹积证
- C. 疳证，疳气证
- D. 疳证，疳积证
- E. 疳证，疳干证

112. 患儿，2岁。形体极度消瘦，面呈老人貌，皮包骨头，腹凹如舟，精神萎靡，大便溏薄，舌淡苔薄腻，其证候是

- A. 疳肿胀
- B. 疳气
- C. 疳积
- D. 干疳
- E. 心疳

113. A. 脾病及心

- B. 脾病及肺
- C. 脾病及肝
- D. 阳虚水泛
- E. 脾病及肾

口疳的病机是

疳肿胀的病机是

、D

114. A. 面色少华，精神尚好

- B. 脘腹胀满，舌苔厚腻
- C. 形体消瘦，精神萎靡
- D. 腹痛拒按，暖气泛酸
- E. 神疲肢倦，大便不调

积滞的主要症状有不思乳食，伴见

疳证的主要症状有不思乳食，伴见

、C

115. 诊断 3 个月至 6 岁小儿营养性缺铁性贫血的标准，其血红蛋白值应低于的数值是

- A. 80g/L
- B. 90g/L
- C. 100g/L
- D. 110g/L
- E. 120g/L

116. 患儿长期纳食不振，形体消瘦，面色苍白，唇淡甲白，舌淡苔白，脉细无力，指纹淡红，Hb—90g/L。治法是

- A. 疏风清热，散结止痛
- B. 温补脾肾，益阴养血
- C. 健运脾胃，益气养血
- D. 补脾养心，益气生血
- E. 滋养肝肾，益精生血

117. 患儿，女，6 岁，营养性缺铁性贫血，面色萎黄，唇淡甲白，发黄稀疏，时有头晕目眩，心悸心慌，夜寐欠安，语声低微，气短懒言，体倦乏力，食欲不振，舌淡红，脉细弱，治疗应首选的方剂是

- A. 补中益气汤
- B. 当归补血汤
- C. 六君子汤
- D. 归脾丸
- E. 左归丸

118. 患儿，11 个月。早产，生后一直人工喂养，经常泄泻。近四个月来食欲不振，面色晄白，唇舌爪甲苍白，毛发稀黄，精神萎靡，手足欠温，舌淡苔白，指纹淡。检查：血红蛋白 60g/L。治疗应首选

- A. 金匱肾气丸
- B. 六味地黄丸
- C. 右归丸
- D. 理中丸
- E. 小建中汤

119. 营养性缺铁性贫血经治疗血红蛋白已达正常水平，仍需服用铁剂的疗程是

- A. 2 周
- B. 1 个月
- C. 2 个月
- D. 3 个月
- E. 4 个月

120. 治疗夜啼心经积热证应首选方剂是

- A. 乌药散合匀气散
- B. 远志丸
- C. 朱砂安神丸

D. 导赤散

E. 清营汤

121. 小儿汗证营卫失调证的汗出特点

- A. 头部、肩背部汗出明显
- B. 汗出肤热，汗渍色黄
- C. 汗出遍身而不温
- D. 头部、手足心汗出明显
- E. 大汗淋漓，或汗出如油

122. 患儿，5岁，盗汗明显，伴自汗，形体消瘦，心烦少寐，口干，手足心灼热，舌淡，苔花剥，其治法是

- A. 益气解表
- B. 调和营卫
- C. 益气养阴
- D. 清热泻脾
- E. 补肾宁心

123. 患儿自汗，头、肩、背出汗明显，活动后加重，易感冒，神倦乏力，面色少华，四肢欠温，舌淡苔薄，脉弱。其治法是

- A. 调和营卫
- B. 益气固表
- C. 益气养阴
- D. 益气敛汗
- E. 敛汗潜阳

124. A. 精亏

- B. 痰湿
- C. 阴虚
- D. 阳虚
- E. 湿热

小儿汗证自汗的病机多属

小儿汗证盗汗的病机多属

、C

125. A. 自汗为主，头部、肩背部明显

- B. 自汗为主，汗出遍身而不温
- C. 盗汗为主，手足心热
- D. 自汗或盗汗，头部、四肢为多
- E. 盗汗为主，遍身汗出

小儿汗证肺卫不固证的主症是

小儿汗证营卫失调证的主症是

、B

126. 下列各项，不属病毒性心肌炎特征的是

A. 神疲乏力

- B. 面色苍白
- C. 心悸气短
- D. 肢冷多汗
- E. 恶寒发热

127. A. 心悸不宁，胸闷憋气，心前区痛如针刺，舌质紫暗，脉结代
B. 心悸不宁，憋气乏力，少气懒言，烦热口渴，舌红少苔，脉细数
C. 心悸怔忡，神疲乏力，畏寒肢冷，舌质淡胖，脉缓无力
D. 寒热起伏，心悸胸闷，肌肉酸痛，腹痛泄泻，舌质红，苔黄腻，脉濡数
E. 心悸气短，胸闷胸痛，发热咳嗽，咽红肿痛，舌红脉数

病毒性心肌炎湿热侵心证的证候是
病毒性心肌炎痰瘀阻络证的证候是
、A

128. 儿童多动症的治疗原则是

- A. 滋肾平肝
- B. 补益心肾
- C. 调和阴阳
- D. 补益心脾
- E. 清热化痰

129. 下列各项，不属于注意力缺陷多动障碍的临床表现是

- A. 情绪不稳
- B. 智力低下
- C. 动作笨拙
- D. 学习成绩差
- E. 经常惹事

130. 男孩，9岁。平时注意力不集中，学习成绩低下，多动难静，急躁易怒，冲动任性，难以自控，夜间盗汗，大便秘结，舌质红，舌苔薄，脉细弦。其治法是

- A. 养心安神，健脾益气
- B. 滋养肝肾，平肝潜阳
- C. 清热泻火，化痰宁心
- D. 安神定志，滋养肝肾
- E. 调和肝脾，佐以益气

131. 男孩，8岁。症见多动多语，冲动任性，难于制约，注意力不集中，胸中烦热，懊侬不眠，便秘尿赤，舌质红，苔黄腻，脉滑数。治疗应首选方剂是

- A. 龙胆泻肝汤
- B. 泻心导赤散
- C. 泻心汤
- D. 清心涤痰汤
- E. 黄连温胆汤

132. 治疗抽动障碍脾虚痰聚证，应首选的方剂是

- A. 逍遥散
- B. 泻青丸
- C. 十味温胆汤
- D. 龙胆泻肝汤
- E. 柴胡疏肝散

133. 患儿，男，11岁。形体消瘦，3年来经常挤眉眨眼，耸肩摇头，有时肢体震颤并口出秽语，时轻时重，手足心热，睡眠不安，舌质红绛，舌苔光剥，脉细数。治疗应首选的方剂是

- A. 大补阴丸
- B. 地黄饮子
- C. 镇肝息风汤
- D. 大定风珠
- E. 三甲复脉汤

134. 不属于惊风四证的是

- A. 痰
- B. 瘀
- C. 热
- D. 惊
- E. 风

135. 下列各项，不属急惊风病因的是

- A. 外感风热
- B. 外感暑热
- C. 感受疫疠
- D. 暴受惊恐
- E. 久病体虚

136. 治疗小儿慢惊风脾虚肝亢证，应首选的方剂是

- A. 羚角钩藤汤
- B. 逐寒荡惊汤
- C. 固真汤
- D. 缓肝理脾汤
- E. 大定风珠

137. 患儿，2岁。半年来经常泄泻，形神疲惫，面色萎黄，大便溏薄，四肢不温，时有抽搐。其证候是

- A. 外感惊风
- B. 痰食惊风
- C. 脾肾阳虚
- D. 土虚木亢
- E. 阴虚风动

138. A. 大定风珠

- B. 十全大补汤
- C. 缓肝理脾汤
- D. 固真汤
- E. 逐寒荡惊汤

治疗慢惊风之脾虚肝亢证，应首选

治疗慢惊风之阴虚风动证，应首选

、A

139. 治疗小儿痫证痰痫证，应首选的方剂是

- A. 涤痰汤
- B. 定痫丸
- C. 温胆汤
- D. 二陈汤
- E. 菖蒲丸

140. 患儿，2 岁，患有癫痫。每次发作时惊叫，吐舌，急啼，面色时红时白，惊惕不安，四肢抽搐，大便黏稠，舌淡红，舌苔白，脉弦滑，指纹色青。治疗首选方为

- A. 定痫丸
- B. 远志丸
- C. 定魄丸
- D. 镇惊丸
- E. 涤痰汤

141. 患儿，8 岁，发作时头晕眩仆，神志不清，单侧或四肢抽搐，抽搐部位及动态较为固定，头痛，大便干硬如羊屎，舌红或见瘀点，舌苔少，脉涩。治疗应首选方剂是

- A. 仁四物汤
- B. 通窍活血汤
- C. 复元活血汤
- D. 少腹逐瘀汤
- E. 膈下逐瘀汤

142. 小儿肾病综合征的诊断要点中，24 小时尿蛋白定量是

- A. $\geq 50\text{mg} / \text{kg}$
- B. $\geq 100\text{mg} / \text{kg}$
- C. $\geq 150\text{mg} / \text{kg}$
- D. $\geq 200\text{mg} / \text{kg}$
- E. $\geq 250\text{mg} / \text{kg}$

143. 患儿，4 岁，眼睑浮肿，按之凹陷即起，伴发热咽痛，舌淡苔薄白。治疗应首选的方剂是

- A. 银翘散
- B. 五苓散
- C. 五皮饮
- D. 五味消毒饮
- E. 麻黄连翘赤小豆汤

144. 患儿浮肿 5 个月，面色无华，神疲乏力，口干咽燥，舌稍红，苔少，脉细数。证候是

- A. 风水相搏证
- B. 气阴两虚证
- C. 脾肾阳虚证
- D. 水毒内闭证
- E. 脾虚湿困证

145. 患儿，6 岁，2 周前患脓疱疮，2 天前出现眼睑及双下肢浮肿，尿量减少，色黄赤，伴头晕，大便干结，舌红，苔黄腻，脉滑数。其治法是

- A. 疏风解表，利水消肿
- B. 清热解毒，利水消肿
- C. 益气健脾，利水消肿
- D. 疏风解表，平肝息风
- E. 清热解毒，平肝息风

146. 患儿，男，9 岁。浮肿，尿少 3 天，10 余天前皮肤疔肿，3 天前出现颜面浮肿，继之波及全身，尿少黄赤，低热口渴，大便干结，舌红，苔黄腻，脉滑数，其治法是

- A. 疏风宣肺，利水消肿
- B. 清热利湿，凉血止血
- C. 清热解毒，利水消肿
- D. 温运中阳，行气利水
- E. 滋阴补肾，淡渗利水

147. 患儿，3 岁。全身明显水肿，按之凹陷难起，腰腹下肢尤甚。畏寒肢冷，神疲倦卧，小便短少，纳少便溏，舌胖质淡苔白，脉沉细。其治法是

- A. 疏风利水
- B. 清热利湿
- C. 健脾渗湿
- D. 温肾健脾
- E. 滋阴补肾

148. 治疗水肿脾肾阳虚证，应首选的方剂是

- A. 温胆汤
- B. 真武汤
- C. 参苓白术散
- D. 防己黄芪汤
- E. 己椒苈黄汤合参附汤

149. 患儿，6 岁。发病 2 周，全身水肿，尿少，头晕，头痛，恶心呕吐，口中气秽，甚至昏迷，舌苔腻，脉滑数。治疗应首选

- A. 羚角钩藤汤
- B. 龙胆泻肝汤
- C. 己椒苈黄丸合参附汤

- D. 温胆汤合附子泻心汤
E. 真武汤

150. A. 浮肿、少尿、血尿、蛋白尿
B. 浮肿、少尿、血尿、高血压
C. 浮肿、少尿、血尿、低白蛋白血症
D. 浮肿、血尿、蛋白尿、低白蛋白血症
E. 浮肿、蛋白尿、高脂血症、低白蛋白血症

急性肾小球肾炎的临床特点是
肾病综合征的临床特点是

、E

151. 尿频脾肾气虚证的症状特点是
A. 病程长，小便频数，尿急，尿痛
B. 病程长，小便频数，滴沥不尽，纳差畏寒
C. 病程长，小便频数短赤，五心烦热
D. 起病急，小便频数，滴沥不尽，小腹坠胀
E. 病程长，小便频数，尿液混浊

152. 患儿，女，6岁，小便短赤频数，起病急，尿道灼热疼痛，尿液混浊，伴发热，烦躁口渴，舌质红，苔黄腻，脉滑数。治法是

- A. 疏风清热，散结止痛
B. 清热解毒，软坚止痛
C. 清热解毒，开窍止痛
D. 清热利湿，通利膀胱
E. 清热解毒，息风开窍

153. 小儿遗尿的中医治疗原则是

- A. 温补肾阳，滋补肾阴
B. 滋阴潜阳，补益肾气
C. 补益肾气，利尿通淋
D. 温补下元，固摄膀胱
E. 补益脾肾，益气温阳

154. 患儿，4岁。每晚尿床1次以上，小便清长，面白少华，神疲乏力，智力较同龄儿稍差，肢冷畏寒，舌质淡，苔白滑，脉沉无力。治疗应首选的方剂是

- A. 桑螵蛸散
B. 交泰丸
C. 补肾地黄丸
D. 菟丝子散
E. 桂枝加龙骨牡蛎汤

155. 补中益气汤合缩泉丸加减治疗遗尿的证候是

- A. 肺脾气虚证
B. 肾气不足证

- C. 脾肾气虚证
- D. 肝经郁热证
- E. 心肾失交证

156. 菟丝子散治疗小儿遗尿的证是

- A. 肺脾气虚证
- B. 肾气不足证
- C. 肝经湿热证
- D. 心肾失交证
- E. 脾虚肝亢证

157. A. 八正散

- B. 缩泉丸
- C. 菟丝子散
- D. 补中益气汤合缩泉丸
- E. 桑螵蛸散

治疗尿频脾肾气虚证的首选方剂是

治疗遗尿肾气不足证的首选方剂是
、C

158. 麻疹顺证皮疹的首见部位是

- A. 臀部
- B. 鼻准部
- C. 胸腹部
- D. 手足心
- E. 耳后发际

159. 患儿，2岁。持续壮热5天，起伏如潮，肤有微汗，烦躁不安，目赤眵多，皮疹布发，疹点由细小稀少而逐渐稠密，疹色先红后暗，皮疹凸起，触之碍手，压之褪色，大便干结，小便短少，舌质红赤，舌苔黄腻，脉数有力。治疗应首选

- A. 宣毒发表汤
- B. 清解透表汤
- C. 沙参麦冬汤
- D. 麻杏石甘汤
- E. 羚角钩藤汤

160. 患儿，男，3岁6个月。壮热持续，烦躁不安，皮疹布发，疹点由细小稀少而逐渐稠密，疹色先红后暗，皮疹凸起，触之碍手，压之退色，大便干结，小便短少，舌质红赤，苔黄腻，脉数有力。其诊断是

- A. 麻疹顺证，初热期
- B. 麻疹顺证，出疹期
- C. 麻疹逆证，邪毒闭肺
- D. 麻疹逆证，邪毒攻喉
- E. 麻疹逆证，邪陷心肝

161. 患儿，男，3岁6个月。麻疹已6日，现高热不退，咳嗽气急，鼻翼煽动，口渴烦躁，疹点密集色暗，舌红苔黄，脉数。其诊断是

- A. 麻疹顺证，初热期
- B. 麻疹顺证，出疹期
- C. 麻疹逆证，邪毒闭肺
- D. 麻疹逆证，邪毒攻喉
- E. 麻疹逆证，邪陷心肝

162. 患儿，2岁。麻疹高热4天，皮肤疹点密集成片，色紫红，遍及周身，神昏，抽搐3次。治疗应首选

- A. 清金化痰汤
- B. 清解透表汤
- C. 羚角钩藤汤
- D. 天麻钩藤饮
- E. 银翘散

163. 患儿，1岁3个月，突发高热4天，神智正常，现热已退，肌肤出现玫瑰色丘疹，皮疹始发于躯干，很快延及全身，肤无痒感。舌质偏红，苔薄少津，指纹淡紫。其治法是

- A. 辛凉透表，清宣肺卫
- B. 清凉解毒，透疹达邪
- C. 疏风解表，清热解毒
- D. 疏风清热，利湿解毒
- E. 清热生津，以助康复

164. 患儿，1岁。发热1天，全身见散在细小淡红色皮疹，喷嚏，流涕，偶有咳嗽，精神不振，胃纳欠佳，耳后髻核肿大，咽红，舌苔薄白。其诊断是

- A. 麻疹
- B. 奶麻
- C. 风痧
- D. 丹痧
- E. 水痘

165. 患儿发热恶风，喷嚏流涕，皮疹起于头面、躯干，随即遍及四肢，疹点稀疏，疹色淡红，耳后及枕部髻核肿大，舌质偏红，苔薄白，脉浮数。证型是

- A. 风水相搏证
- B. 邪犯肺卫证
- C. 脾肾阳虚证
- D. 水毒内闭证
- E. 脾虚湿困证

166. 患儿，4岁。晨起喷嚏，流涕，继而发热，体温38.1℃，精神倦怠，晚间头面、躯干见稀疏细小皮疹，疹色淡红。治疗应首选

- A. 银翘散
- B. 葱豉汤

- C. 桑菊饮
- D. 杏苏散
- E. 清营汤

167. A. 发热 3~4 天，热退疹出
B. 发热 3~4 天，皮疹出现，热度增高
C. 发热 1~2 天，出现斑疹、丘疹、水疱及结痂
D. 发热 1~2 天出疹，疹点细小有痒感
E. 发热半天至 1 天出疹，疹点细小鲜红，颜面无疹

麻疹的特点是
风痧的特点是

、D

麻疹好发年龄为 6 个月至 5 岁

奶麻好发年龄为 6~18 个月小儿

风痧多见于 1~5 岁的小儿

丹痧 2~8 岁的儿童发病率较高

水痘多见于 6~9 岁儿童

手足口病常见于 5 岁以下小儿

疮腮好发于 3 岁以上儿童

传单多见于年长儿及青少年

顿咳 5 岁以下小儿最易发病

麻疹-肺脾-冬春

奶麻-肺脾-冬春

风痧-肺卫-冬春

丹痧-肺胃-冬春

水痘-肺脾-冬春

手足口病-肺脾-夏秋

疮腮-足少阳经-冬春

传单-肺胃-四季

顿咳-肺-冬春

168. 丹痧疹后阴伤证的治法是

- A. 辛凉宣透，清热利咽
- B. 养阴清热，宣肺止咳
- C. 清气凉营，泻火解毒
- D. 益气养阴，润肺止咳
- E. 养阴生津，清热润喉

169. A. 滑润舌

B. 地图舌

C. 红绛舌

D. 草莓舌

E. 霉酱舌

丹痧的典型舌象是

胃之气阴不足的典型舌象是

、B

170. A. 肺脾

B. 心脾

C. 脾胃

D. 肺肝

E. 肺胃

麻疹顺证病位是

猩红热病位是

、E

171. A. 宣毒发表汤

B. 清解透表汤

C. 透疹凉解汤

D. 解肌透痧汤

E. 凉营清气汤

治疗麻疹初热期，应首选

治疗丹痧毒炽气营证，应首选

、E

172. 小儿水痘的皮疹特点是

A. 丘疹、疱疹、结痂同时存在

B. 疹退后糠麸样脱屑

C. 热退疹出

D. 疹退后无脱皮

E. 疹退后留瘢痕

173. 患儿发热轻微，鼻塞流涕，喷嚏，咳嗽，1天后出皮疹，疹色红润，疱浆清亮，皮疹瘙痒，分布稀疏，以躯干为多，舌苔薄白，脉浮数。方剂是

A. 生脉散

B. 银翘散

C. 六味地黄汤

D. 增液承气汤

E. 养阴清胃汤

174. 患儿，6岁。发热2天，出现淡红色小丘疹，根盘红晕，丘疹上部可见疱疹，形态椭圆，疱浆清亮，皮疹以躯干为多，苔薄白，脉浮数。其治法是

A. 疏风清热，利湿解毒

B. 清气凉营，解毒化湿

C. 发散风寒，清热利湿

D. 芳香化湿，兼以健脾

E. 清解郁热，活血化瘀

175. A. 桑菊饮

B. 银翘散

C. 透疹凉解汤

D. 清胃解毒汤

E. 普济消毒饮

治疗风痧邪犯肺卫证，应首选的方剂是

治疗水痘邪伤肺卫证，应首选的方剂是

、B

176. 下列关于手足口病的叙述，正确的是

A. 皮疹呈向心性分布

B. 疹退后局部留有瘢痕

C. 疱疹壁薄易破，疱浆清亮

D. 疹退后在皮疹部位有色素沉着

E. 皮疹以口腔、四肢为主，口腔疱疹破溃后形成溃疡

177. 患儿轻微发热，口腔内疱疹，破溃后形成小溃疡，疼痛，随后手掌足趾部出现疱疹，疹色红润，分布稀疏，疱液清亮，舌质红，苔薄黄腻，脉浮数。证型是

A. 风水相搏证

B. 邪犯肺脾证

C. 脾肾阳虚证

D. 水毒内闭证

E. 脾虚湿困证

178. 适宜用清热解毒，软坚散结法治疗的流行性腮腺炎的证候是

A. 邪犯少阳证

B. 毒窜睾腹证

C. 邪陷厥阴证

D. 热毒壅盛证

E. 邪陷心肝证

179. 流行性腮腺炎毒窜睾腹证的治法是

A. 疏风清热，散结止痛

B. 清热解毒，软坚止痛

C. 清热解毒，开窍止痛

D. 清肝泻火，活血止痛

E. 滋阴降火，活血消肿

180. 患儿，8岁。发热2天，左侧腮部肿胀、疼痛，边缘不清，触之痛甚，咀嚼不便。伴头痛，咽痛，纳少，舌红苔薄黄，脉浮数。其治法是

A. 清热解毒，软坚散结

B. 疏风清热，散结消肿

C. 疏肝理气，软坚散结

D. 清肝泻火，活血镇痛

E. 滋阴降火，活血消肿

181. 治疗疟腮热毒壅盛证，应首选的方剂是

A. 银翘散

B. 清瘟败毒饮

- C. 柴胡葛根汤
- D. 龙胆泻肝汤
- E. 普济消毒饮

182. 患儿，男，10岁。患疔腮腮部肿胀渐消退，右侧睾丸肿胀疼痛，舌红苔黄，脉数。治疗应首选

- A. 银翘散
- B. 小柴胡汤
- C. 知柏地黄丸
- D. 龙胆泻肝汤
- E. 普济消毒饮

183. 下列各项，属传染性单核细胞增多症临床特点是

- A. 白细胞明显升高
- B. 白细胞明显降低
- C. 单核细胞明显升高
- D. 淋巴细胞明显降低
- E. 异形淋巴细胞增多

184. 百日咳痉咳期的治法是

- A. 清肺化痰
- B. 宣肺止咳
- C. 清热肃肺
- D. 泻肺镇咳
- E. 滋阴润肺

185. 患儿，2岁。初起发热、流涕、咳嗽，咳嗽以入夜为甚，咳声不扬，尚未发生痉咳，舌苔薄白。治疗应首选的方剂是

- A. 桑白皮汤
- B. 三拗汤
- C. 沙参麦冬汤
- D. 人参五味子汤
- E. 清燥救肺汤

186. 患儿，2岁。咳嗽2周，日轻夜重，咳后伴有深吸气样鸡鸣声，吐出痰涎或食物后暂时缓解，不久又复发，昼夜达十余次，舌质红，舌苔黄，脉滑数。治疗应首选

- A. 桑白皮汤合葶苈大枣泻肺汤
- B. 苏子降气汤合黛蛤散
- C. 麻杏石甘汤合苏葶丸
- D. 麻黄汤合葶苈大枣泻肺汤
- E. 泻白散合黛蛤散

187. 患儿，3岁。患百日咳后，痉咳缓解，出现低热干咳，盗汗，夜寐不安，舌质红，苔光剥。治疗应首选的方剂是

- A. 桑白皮汤
- B. 养阴清肺汤
- C. 沙参麦冬汤
- D. 人参五味子汤
- E. 清燥救肺汤

188. 治疗蛔厥证，应首选的方剂是

- A. 使君子散
- B. 驱蛔承气汤
- C. 乌梅丸
- D. 芍药甘草汤
- E. 人参五味子汤

189. 患儿，7 岁。突然胃脘部绞痛，弯腰曲背，肢冷汗出，呕吐蛔虫 1 条。治疗应首选

- A. 使君子散
- B. 加味温胆汤
- C. 丁萸理中汤
- D. 乌梅丸
- E. 定吐丸

190. A. 右下腹
- B. 脐周
 - C. 左下腹
 - D. 右上腹
 - E. 无定处

蛔虫肠虫证疼痛部位是

蛔虫蛔厥证疼痛部位是

、D

191. 患儿，2 岁。时值夏季，发热持续 1 月余，朝盛暮衰，口渴多饮，尿多清长，无汗，面色苍白，下肢欠温，大便溏薄，舌淡苔薄。治疗应首选

- A. 白虎汤
- B. 新加香薷饮
- C. 温下清上汤
- D. 竹叶石膏汤
- E. 王氏清暑益气汤

192. 紫癜阴虚火旺证的治法是

- A. 疏风散邪，清热凉血
- B. 滋阴降火，凉血止血
- C. 理气化痰，活血止痛
- D. 健脾养心，益气摄血
- E. 清热解毒，凉血止血

193. 紫癜风热伤络证的治法是

- A. 清热解毒，凉血止血
- B. 健脾养心，益气摄血
- C. 滋阴降火，凉血止血
- D. 凉营清气，泻火解毒
- E. 疏风散邪，清热凉血

194. 患儿，男，8岁。全身皮肤紫癜1天，皮疹以下双下肢及臀部居多，呈对称分布，色泽鲜红，大小不一，伴有发热、腹痛、关节肿痛，舌质红，苔薄黄，脉浮数。治疗应首选的方案是

- A. 桑菊饮
- B. 大补阴丸
- C. 杞菊地黄丸
- D. 犀角地黄汤
- E. 连翘败毒散

195. A. 归脾汤
B. 黄连解毒汤
C. 犀角地黄汤
D. 清瘟败毒饮
E. 大补阴丸

紫癜反复出现，面色苍黄，食欲不振，头晕心慌，方剂是
紫癜反复出现，血色鲜红，低热盗汗，心烦少寐，方剂是
、E

196. A. 风热伤络证
B. 虚热妄行证
C. 气不摄血证
D. 阴虚火旺证
E. 气滞血瘀证

连翘败毒散治疗紫癜的证候是
大补阴丸治疗紫癜的证候是
、D

197. 患儿发热8天，遍身多形红斑、球结膜充血、草莓舌和颈淋巴结肿大、手足硬肿，应首先考虑的是

- A. 紫癜
- B. 皮肤粘膜淋巴结综合征
- C. 麻疹
- D. 丹痧
- E. 风痧

198. 治疗维生素D缺乏性佝偻病肾精亏损证，应首选的方剂是

- A. 左归丸
- B. 右归丸
- C. 金匱肾气丸
- D. 补肾地黄丸

E. 十全大补汤

199. 患儿，7 个月。辅食未加，头部多汗，发稀枕秃，囟门宽大，夜间婴闹不安，易惊多惕，纳呆食少，舌淡红，苔薄白，指纹淡红，其证型

- A. 肾精亏损证
- B. 脾虚肝旺证
- C. 心肝火旺证
- D. 肺脾气虚证
- E. 肝肾阴亏证