

中西医儿科 50 题



中西医助理医师模考大赛



医学教育网  
www.med66.com

1. 按中医五脏六腑的生理功能和病理表现, 来分析内脏病变的部位和性质的辨证方法属于

- A. 八纲辨证
- B. 脏腑辨证
- C. 气血津液辨证
- D. 卫气营血辨证
- E. 以上都不是

2. 小儿生长发育最迅速的时期是

- A. 幼儿期
- B. 新生儿期
- C. 学龄期
- D. 学龄前期
- E. 婴儿期

3. 正常情况下, 小儿出现颈椎前凸的时间是

- A. 2 个月
- B. 3 个月
- C. 4 个月
- D. 6 个月
- E. 7 个月

4. 两岁小儿的头围正常值为

- A. 42cm
- B. 44cm
- C. 46cm
- D. 48cm
- E. 50cm

5. 重度脱水时患儿失水量约为体重的

- A. 5%以下
- B. 8%左右
- C. 5%~10%
- D. 10%左右
- E. 10%以上

6. 察目应首选观察的项目是

- A. 眼神
- B. 瞳孔
- C. 眼睑
- D. 巩膜

E. 结膜 



7. 3岁以下小儿正常指纹是

- A. 淡紫隐隐显于风关之下
- B. 淡紫隐隐显于风关
- C. 色泽鲜红显于风关
- D. 淡紫隐隐显于气关
- E. 色泽青黑显于风关



8. 下列关于望小儿姿态的叙述正确的是

- A. 喜蜷卧者，多为内伤乳食
- B. 喜伏卧者，多为内寒或腹痛
- C. 气促鼻扇，胸肋凹陷，常为哮喘
- D. 端坐喘促，痰鸣哮吼，多为肺炎喘嗽
- E. 翻滚不安，呼叫哭吵，双手捧腹，多为腹痛



9. 下列哪项不属于小儿反复呼吸道感染的病因

- A. 喂养不当，调护失宜
- B. 少见风日，不耐风寒
- C. 湿蕴脾胃，熏蒸肝胆
- D. 用药不当，损伤正气
- E. 正虚邪伏，遇感乃发



10. 小儿风热感冒的治法宜选用

- A. 辛温解表
- B. 辛凉解表
- C. 清暑解表
- D. 清热解毒
- E. 辛凉解毒

11. 风寒感冒的首选方剂是

- A. 二陈汤
- B. 银翘散
- C. 桑菊饮
- D. 沙参麦冬汤
- E. 荆防败毒散



12. 下列属于小儿肺炎阴虚肺热证治法的是

- A. 辛温宣肺，化痰止咳
- B. 辛凉宣肺，清热化痰
- C. 清热涤痰，开肺定喘
- D. 清热解毒，泻肺开闭
- E. 养阴清肺，润肺止咳



13. 小儿肺炎风热闭肺的首选方剂是

- A. 三拗汤
- B. 桑菊饮
- C. 沙参麦冬汤
- D. 荆防败毒散
- E. 银翘散合麻杏石甘汤

14. 下列哪项不是热性哮喘的证候特点

- A. 四肢不温
- B. 口渴引饮
- C. 身热面赤
- D. 舌红苔黄
- E. 咳嗽气喘

15. 病毒性心肌炎的中医发病外因是

- A. 正气亏虚
- B. 温热邪毒
- C. 麻毒时邪
- D. 暑湿疫毒
- E. 湿热邪毒

16. 病毒性心肌炎的病变部位在心，常涉及的脏腑是

- A. 肺、脾、肝
- B. 肺、脾、肾
- C. 肺、肝、肾
- D. 肝、脾、肾
- E. 肺、脾

17. 鹅口疮的主要临床特征是

- A. 口腔内满布红色溃疡
- B. 咽喉部白色假膜
- C. 牙龈满布白色疱疹
- D. 口腔周围满布白色小红点
- E. 口腔舌面满布灰白色乳凝块样白膜

18. 下列除哪项外均是应与胃炎相鉴别的疾病

- A. 消化性溃疡
- B. 急性胰腺炎
- C. 肠蛔虫症
- D. 肠痉挛
- E. 肠套叠

19. 小儿伤食泻的治法为

- A. 运脾和胃，消食化滞
- B. 清肠解热，化湿止泻
- C. 疏风散寒，化湿和中
- D. 健脾益气，助运止泻
- E. 温补脾肾，固涩止泻

20. 下述病史与急性肾小球肾炎关系最为密切的是

- A. 1~3周前上呼吸道感染



B. 3 前天腹泻

C. 2 周前腰部外伤史

D. 3 个月前有猩红热史

E. 2 个月前有水痘病史

21. 小儿急性肾小球肾炎水毒内闭证的首选方是

A. 温胆汤合附子泻心汤

B. 五味消毒饮合五皮饮

C. 己椒苈黄丸合参附汤

D. 五苓散合五皮饮

E. 龙胆泻肝汤合羚角钩藤汤

22. 小儿肾病综合征肺脾气虚证的首选方是

A. 参苓白术散

B. 六味地黄丸

C. 知柏地黄丸

D. 防己黄芪汤合五苓散

E. 防己黄芪汤合己椒苈黄丸

23. 下列哪项不是小儿肾病综合征脾肾阳虚证的证候特点

A. 高度浮肿，按之没指

B. 舌红苔黄，脉搏细数

C. 尿少腹胀，食欲减退

D. 小便短少不利

E. 畏寒肢冷，神疲蜷卧

24. 病毒性脑炎的病变部位是

A. 心、肝

B. 心、肺

C. 心、肝、肾

D. 肝、肾、脑窍

E. 心、肝、脑窍

25. 不属于病毒性脑炎临床表现的是

A. 头痛、呕吐

B. 嗜睡、昏睡

C. 发热、惊厥

D. 尿血、尿痛

E. 烦躁不安、易激惹

26. 不属于癫痫常见的临床表现的是

A. 肢体肌肉强直

B. 一过性意识丧失

C. 阵挛性抽搐

D. 知觉异常

E. 精神萎靡

27. 小儿注意力缺陷障碍肾虚肝亢证治疗首选方为

A. 归脾汤

B. 甘麦大枣汤



- C. 黄连温胆汤
- D. 杞菊地黄丸
- E. 六味地黄丸

28. 下列关于铁剂治疗营养性缺铁性贫血的停药指征正确的是

- A. 血红蛋白升至正常后 1 个月
- B. 血红蛋白升至正常后 2 个月
- C. 血红蛋白升至正常后 3 个月
- D. 血红蛋白升至正常后 4 个月
- E. 血红蛋白升至正常后 5 个月



29. 营养性缺铁性贫血, 铁剂治疗后停药指征为

- A. 网织红细胞升高后再用 1~2 个月
- B. 血红蛋白及红细胞恢复正常
- C. 面色转红, 精神及食欲好转
- D. 血清铁恢复正常
- E. 血红蛋白及红细胞恢复正常后再用 6~8 周左右



30. 过敏性紫癜风热伤络证的首选方剂是

- A. 桑菊饮
- B. 银翘散
- C. 四妙散
- D. 茜根散



E. 犀角地黄汤



31. 佝偻病后遗症期重症患儿的主要表现是

- A. 骨骼畸形
- B. 睡眠不安及多汗
- C. X 线长骨骺端呈毛刷样改变
- D. 血磷下降, 血钙正常
- E. 肌肉韧带松弛



32. 治疗蛋白质-能量营养不良之干疳证首选方剂是

- A. 肥儿丸
- B. 八珍汤
- C. 资生健脾丸
- D. 参苓白术散
- E. 石斛夜光丸



33. 流行性腮腺炎的潜伏期为

- A. 1~2 天
- B. 3~5 天
- C. 6~18 天
- D. 12~21 天
- E. 14~21 天



34. 流行性腮腺炎的肿胀部位以下列哪项为中心

- A. 颌下
- B. 颈下
- C. 耳后



D. 耳垂

E. 面颊部

35. 下列各项中，关于麻疹邪陷心肝证的叙述不正确的是

A. 疹点密集成片，色泽紫暗

B. 高热不退，烦躁谵妄

C. 舌红绛，苔黄糙，脉数

D. 治法为平肝息风，清心开窍

E. 方剂首选镇肝熄风汤



36. 下列属于手足口病病变部位的是

A. 心肺

B. 脾胃

C. 肝脾

D. 肺脾

E. 肺肾



37. 水痘患儿，低热恶寒，鼻塞流涕，疹色红润，疱浆清亮，点粒稀疏，根盘红晕不明显，舌质红，苔薄白，脉浮数。其证型是

A. 风热重证

B. 肺胃蕴热

C. 毒热重证

D. 邪郁肺卫

E. 毒在气营



38. 治疗毒邪内闭所致之中毒型细菌性痢疾，方剂宜选用

A. 龙胆泻肝汤

B. 甘露消毒丹

C. 清瘟败毒饮

D. 普济消毒饮

E. 黄连解毒汤



39. 蛔虫病以腹痛为主要症状其疼痛部位主要在

A. 胃脘部

B. 左下腹

C. 脐周部

D. 右下腹

E. 痛无定处



40. 引起小儿心搏骤停的常见原因不包括的是

A. 心肌病

B. 心肌炎

C. 失血性休克

D. 先天性心脏病

E. 呼吸窘迫综合征



41. 下列除哪项外均是便秘的病因病机

A. 乳食积滞

B. 燥热内结

C. 肠道蛔虫



D. 气机郁滞

E. 气血不足

42. 下列关于腹痛的各中医辨证治疗叙述错误的是

A. 腹部中寒证首选养脏散

B. 乳食积滞证首选消乳丸

C. 胃肠结热证首选大承气汤

D. 脾胃虚寒证首选小建中汤

E. 气滞血瘀证首选少腹逐瘀汤



43. 关于八候的叙述正确的是

A. 搐、搦、颤、掣、反、引、窜、热

B. 搐、搦、颤、掣、反、引、窜、视

C. 搐、惊、颤、掣、反、引、窜、视

D. 搐、搦、颤、掣、反、惊、窜、视

E. 搐、搦、颤、惊、反、引、窜、视



44. 慢性咳嗽风伏肺络证的方药是

A. 二陈汤合三子养亲汤

B. 清气化痰汤

C. 三拗汤合苍耳子散

D. 黛蛤散合泻白散

E. 异功散合玉屏风散



45. 治疗厌食脾失健运证的首选方剂是


A. 消乳丸

B. 保和丸

C. 健脾丸

D. 异功散

E. 不换金正气散



46. 厌食的针灸疗法中，治疗脾胃气虚证的穴位不包括

A. 脾俞

B. 胃俞

C. 阴陵泉

D. 足三里

E. 三阴交



47. 治疗心肾失交所致的小儿遗尿，方剂宜选用

A. 缩泉丸

B. 菟丝子散

C. 龙胆泻肝汤

D. 补中益气汤

E. 交泰丸合导赤散



48. 性早熟之阴虚火旺证的首选方剂是

A. 知柏地黄丸

B. 丹栀逍遥散

C. 黄连解毒汤

D. 黄连温胆汤



E. 柴胡疏肝散

49. 小儿肺炎风寒闭肺证的治法是

- A. 辛温宣肺，化痰止咳
- B. 辛凉宣肺，清热化痰
- C. 清热涤痰，开肺定喘
- D. 清热解毒，泻肺开闭
- E. 养阴清肺，润肺止咳



50. 小儿常用内治法中消食导滞法之消食化积常用方为

- A. 消乳丸
- B. 保和丸
- C. 健脾丸
- D. 枳实导滞丸
- E. 资生健脾丸





### 答案部分

1. 【正确答案】B

【答案解析】脏腑辨证是按中医五脏六腑的生理功能和病理表现，来分析内脏病变的部位和性质。

2. 【正确答案】E

【答案解析】婴儿期是小儿生长发育最迅速的时期。

3. 【正确答案】B

【答案解析】小儿脊柱发育：3个月左右随着抬头动作的发育出现颈椎前凸；6个月后会坐时，出现向后凸的胸曲；1岁会走时出现腰椎前凸，至6~7岁时这三个脊柱自然弯曲才被韧带所固定，脊柱的生理弯曲使身体姿势得到平衡。

4. 【正确答案】D

【答案解析】新生儿头围平均34cm，在第一年的前3个月和后9个月头围都约增长6cm，故1岁时头围为46cm；生后第2年头围增长减慢，2岁时头围48cm，5岁时为50cm，15岁时接近成人约为54~58cm。头围测量在2岁前最有价值，头围过大常见于脑积水和佝偻病后遗症，头围过小提示脑发育不良。

5. 【正确答案】E

【答案解析】轻度脱水：失水量占体重5%以下（30~50ml/kg）。中度脱水：失水量占体重的5%~10%（50~100ml/kg）。重度脱水：失水量占体重的10%以上（100~120ml/kg）。

6. 【正确答案】A

【答案解析】察目时首先观察的是眼神。若黑睛圆大、光亮灵活，为肝肾气血充沛；眼无光彩，二目无神，为病态；两目凝视，或直或斜，多为肝风内动；瞳孔散大，对光反射迟钝，病多危重；瞳孔缩小，多为热毒内闭，见于中毒（有机磷、毒蕈或某些药物）。注意眼窝有无凹陷眼睑有无浮肿、下垂，结膜是否充血、巩膜是否黄染。

7. 【正确答案】A

【答案解析】正常小儿的指纹隐约可见，色泽淡紫，纹形伸直，不超过风关。

8. 【正确答案】E

【答案解析】喜伏卧者，多为内伤乳食；喜蜷卧者，多为内寒或腹痛；翻滚不安，呼叫哭吵，双手捧腹，多为腹痛；端坐喘促，痰鸣哮喘，多为哮喘；气促鼻扇，胸肋凹陷，常为肺炎喘嗽。除了选项E的叙述正确外，其余选项叙述均不恰当。故根据题干要求，此题的正确选项为E。

9. 【正确答案】C

【答案解析】反复呼吸道感染的中医病因有：（1）禀赋不足，体质虚弱；（2）喂养不当，调护失宜；（3）少见风日，不耐风寒；（4）用药不当，损伤正气；（5）正虚邪伏，遇感乃发。

故所给的选项中只有C项是不属于小儿反复呼吸道感染的病因。

10. 【正确答案】B

【答案解析】风热感冒的证候：发热重，恶风，有汗或少汗，头痛，鼻塞，鼻流浊涕，喷嚏，咳嗽，痰稠色白或黄，咽红肿痛，口干渴，舌质红，苔薄黄，脉浮数或指纹浮紫。

治法：辛凉解表。

方药：银翘散加减。

11. 【正确答案】E

【答案解析】风寒感冒的证候：发热，恶寒，无汗，头痛，鼻流清涕，喷嚏，咳嗽，咽部不红肿，舌淡红，苔薄白，脉浮紧或指纹浮红。

治法：辛温解表。

方药：荆防败毒散加减。

12. 【正确答案】E

【答案解析】小儿肺炎之阴虚肺热证。

证候：病程较长，低热盗汗，干咳无痰，面色潮红，舌红少津，舌苔花剥、苔少或无苔，脉细数。

治法：养阴清肺，润肺止咳。

方药：沙参麦冬汤加减。

13. 【正确答案】E

【答案解析】风热闭肺证证候：初起证候稍轻，发热恶风，咳嗽气急，痰多，痰稠黏或黄，口渴咽红，舌红，苔薄白或黄，脉浮数。重证则见高热烦躁，咳嗽微喘，气急鼻扇，喉中痰鸣，面色红赤，便干尿黄，舌红苔黄，脉滑数，指纹紫滞。

治法：辛凉宣肺，化痰止咳。

方药：银翘散合麻杏石甘汤加减。

14. 【正确答案】A

【答案解析】热性哮喘证候：咳喘哮鸣，声高息涌，痰稠色黄，发热面红，胸闷膈满，渴喜冷饮，小便黄赤，大便干燥或秘结，舌红，舌苔黄腻，脉象滑数，指纹紫。

选项 A 中四肢不温是寒性哮喘的证候特点。故在此，最佳的选项是 A。

15. 【正确答案】B

【答案解析】病毒性心肌炎的中医病因病机：小儿素体正气亏虚是发病之内因，温热邪毒侵袭是发病之外因。故此题的正确选项是 B。

16. 【正确答案】B

【答案解析】病毒性心肌炎病变部位主要在心，常涉及肺、脾、肾。

17. 【正确答案】E

【答案解析】鹅口疮临床特征主要为口腔黏膜上出现白色或灰白色乳凝块样白膜。

18. 【正确答案】E

【答案解析】除 E 项外，均需与小儿胃炎相鉴别。

19. 【正确答案】A

【答案解析】伤食泻证候：大便稀溏，夹有乳凝块或食物残渣，气味酸臭，或如败卵，脘腹胀满，便前腹痛，泻后痛减，腹痛拒按，暖气酸馊，或有呕吐，不思乳食，夜卧不安，舌苔厚腻，或微黄，脉滑实，指纹滞。

治法：运脾和胃，消食化滞。

方药：保和丸加减。

20. 【正确答案】A

【答案解析】急性肾小球肾炎临床表现：

(1) 前驱感染：发病前 1~3 周有上呼吸道或皮肤等前驱感染。

(2) 典型表现：起病时可有低热、疲倦乏力、食欲不振等，肾炎症状主要表现为水肿、血尿和高血压。

21. 【正确答案】A

【答案解析】急性肾小球肾炎水毒内闭证。

证候：全身浮肿，尿少或尿闭，色如浓茶，头晕头痛，恶心呕吐，嗜睡，甚则昏

迷，舌质淡胖，苔垢腻，脉象滑数或沉细数。

治法：通腑泄浊，解毒利尿。

方药：温胆汤合附子泻心汤加减。

22. 【正确答案】D

【答案解析】肾病综合征之肺脾气虚证。

证候：全身浮肿，面目为著，尿量减少，面白身重，气短乏力，纳呆便溏，自汗出，易感冒，或有上气喘息，咳嗽，舌淡胖，苔薄白，脉虚弱。

治法：益气健脾，宣肺利水。

方药：防己黄芪汤合五苓散加减。

23. 【正确答案】B

【答案解析】脾肾阳虚证的证候：全身明显浮肿，按之深陷难起，腰腹下肢尤甚，网面白无华，畏寒肢冷，神疲蜷卧，小便短少不利，可伴有胸水、腹水，纳少便溏，恶心呕吐，舌质淡胖或有齿痕，苔白滑，脉沉细无力。

24. 【正确答案】E

【答案解析】病毒性脑炎病位在心、肝、脑窍。

25. 【正确答案】D

【答案解析】病毒性脑炎临床表现：

(一) 前驱症状：可有发热，头痛，上呼吸道感染症状，精神萎靡，恶心呕吐，腹痛，肌痛。

(二) 神经系统症状体征：主要为发热，颅内压增高，不同程度的意识障碍及反复惊厥发作等症状。

1. 颅内压增高表现为头痛、呕吐、血压增高等，小婴儿表现为烦躁不安、易激惹、前囟饱满等，若出现呼吸节律不规则或瞳孔不等大，则考虑颅内高压并发脑疝的可能性。

2. 意识障碍可表现有嗜睡、昏睡及昏迷等，部分患儿表现为精神情绪异常，如躁狂、幻觉、失语以及定向力、计算力与记忆力障碍等。

3. 惊厥主要表现为全部或局灶抽搐发作。

4. 病理征和脑膜刺激征阳性。

5. 因感染病毒不同，临床伴有症状各有特点，如肠道病毒性脑炎，可出现皮疹；单纯疱疹病毒性脑炎常有口唇或角膜疱疹；腮腺炎病毒性脑炎常有腮腺肿大。

26. 【正确答案】E

【答案解析】癫痫主要表现为一过性的意识丧失或意识改变，肢体肌肉强直或阵挛性抽搐，还可出现行为、情感、知觉等方面的异常。

27. 【正确答案】D

【答案解析】小儿注意力缺陷障碍肾虚肝亢证。

证候表现：多动难静，急躁易怒，冲动任性，难以自控，神思涣散，动作笨拙，注意力不集中，五心烦热，睡眠不宁，或学习成绩低下，记忆力欠佳，或有遗尿，腰酸乏力，大便秘结，舌红，苔薄，脉弦细。

治法：滋水涵木，平肝潜阳。

方药：杞菊地黄丸加减。

28. 【正确答案】B

【答案解析】营养性缺铁性贫血的铁剂治疗：铁剂治疗有效者于2~3天后网织红细胞即见升高，5~7天达高峰，2~3周后下降至正常；治疗约2周后，血红

蛋白相应增加，临床症状亦随之好转。血红蛋白达正常水平后应继续服用铁剂6~8周左右再停药，以补足铁的贮存量。故根据题干要求，此题的正确选项是B。

29. 【正确答案】E

【答案解析】铁剂治疗有效者于2~3天后网织红细胞即见升高，5~7天达高峰，2~3周后下降至正常；治疗约2周后，血红蛋白相应增加，临床症状亦随之好转。血红蛋白达正常水平后应继续服用铁剂6~8周左右再停药，以补足铁的贮存量。如3周内血红蛋白上升不足20g/L，应注意寻找原因。

30. 【正确答案】B

【答案解析】过敏性紫癜风热伤络证。

证候：紫癜见于下半身，以下肢和臀部为多，呈对称性，颜色鲜红，呈丘疹或红斑，大小形态不一，可融合成片，或有痒感，伴发热，微恶风寒，咳嗽，咽红，或见关节痛，腹痛，便血，尿血，舌质红，苔薄黄，脉浮数。

治法：祛风清热，凉血安络。

方药：银翘散加减。

31. 【正确答案】A

【答案解析】佝偻病后遗症期：临床症状消失，血生化和X线摄片正常。少数重症佝偻病可残留不同程度的骨骼畸形，多见于2岁以上儿童。

32. 【正确答案】B

【答案解析】干疳证的证候：形体极度消瘦，皮肤干瘪起皱，大肉已脱，呈老人貌，毛发干枯，面色无华，精神萎靡，啼哭无泪，杳不思食，或见肢体浮肿，或见皮肤瘀点、瘀斑等，舌质淡嫩，苔少，脉细弱无力。

治法：补益气血。

方药：八珍汤加减。

33. 【正确答案】E

【答案解析】流行性腮腺炎潜伏期为2~3周。故根据所给选项，最佳的是E。

34. 【正确答案】D

【答案解析】腮腺肿胀是以耳垂为中心，向前、后、下发展，边缘不清、触之有弹性感及触痛，表面皮肤不红，张口、咀嚼困难。腮肿约3~5天达高峰，1周左右逐渐消退。

35. 【正确答案】E

【答案解析】麻疹邪陷心肝证。

证候：疹点密集成片，色泽紫暗，高热不退，烦躁谵妄，甚则神昏，抽搐，舌红绛，苔黄糙，脉数。

治法：平肝息风，清心开窍。

方药：羚角钩藤汤加减。

36. 【正确答案】D

【答案解析】引起手足口病的病因为感受手足口病时邪，其病变部位在肺脾二经。

37. 【正确答案】D

【答案解析】水痘的邪郁肺卫证。

证候：发热轻微，或无热，鼻塞流涕，喷嚏，咳嗽，起病后1~2天出皮疹，疹色红润，疱浆清亮，根盘红晕，皮疹瘙痒，分布稀疏，多见于躯干、颜面及头皮，舌质淡，苔薄白，脉浮数。

38. 【正确答案】E

【答案解析】中毒型细菌性痢疾之毒邪内闭证

证候: 突然高热, 烦躁萎靡, 或恶心呕吐, 反复惊厥, 神志昏迷或见呼吸困难, 节律不整, 可有下痢脓血, 或虽未见下痢脓血, 但用棉签在肛门内检测到黏液粪便, 舌质红, 苔黄厚或灰糙, 脉数。

治法: 清肠解毒, 泄热开窍。

方药: 黄连解毒汤加味。

39. 【正确答案】C

【答案解析】蛔虫病患者常腹痛, 位于脐周, 不剧烈, 喜按揉。

40. 【正确答案】E

【答案解析】心搏骤停的病因有心肌病、心肌炎、先天性心脏病、循环系统状态不稳定, 如失血性休克、心力衰竭、严重低血压、严重心律失常以及各种意外损伤等。选项 E 中的内容是引起小儿呼吸骤停的原因, 故根据题干要求, 此题的正确选项是 E。

41. 【正确答案】C

【答案解析】小儿便秘常见病因: 乳食积滞、燥热内结、气机郁滞、气血不足。

42. 【正确答案】B

【答案解析】腹痛之乳食积滞证。

证候: 脘腹胀满, 疼痛拒按, 不思乳食, 暖腐吞酸, 或时有呕吐, 吐物酸馊, 或腹痛欲泻, 泻后痛减, 矢气频作, 粪便秽臭, 夜卧不安, 时时啼哭, 舌淡红, 苔厚腻, 脉象沉滑, 或指纹紫滞。

治法: 消食导滞, 行气止痛。

方药: 香砂平胃散加减。

故选项 B 的叙述是错误的, 因此结合题干要求, 此题的正确选项是 B。

43. 【正确答案】B

【答案解析】八候: 搐、搦、颤、掣、反、引、窜、视。故正确的选项是 B。

44. 【正确答案】C

【答案解析】慢性咳嗽风伏肺络证, 证候: 久咳, 早晚咳嗽为主, 遇冷空气或活动后加重, 干咳为主, 痰少, 鼻塞, 流涕, 喷嚏, 清嗓, 舌质淡红, 苔薄白, 脉浮数。过敏体质, 多有过敏性疾病家族史。治法: 疏风通窍, 宣肺止咳。方药: 三拗汤合苍耳子散加减。

45. 【正确答案】E

【答案解析】厌食脾失健运证证候: 食欲不振, 厌恶进食, 食而乏味, 或伴胸脘痞闷, 暖气泛恶, 大便不调, 偶尔多食后则脘腹饱胀, 形体尚可, 精神正常, 舌淡红, 苔薄白或薄腻, 脉尚有力。

治法: 调和脾胃, 运脾开胃。

方药: 不换金正气散加减。

46. 【正确答案】C

【答案解析】厌食的针灸疗法中取脾俞、胃俞、足三里、三阴交, 用补法。用于治疗脾胃气虚证。选项 C 中阴陵泉主要是用于治疗脾胃阴虚证。故此题的正确选项是 C。

47. 【正确答案】E

【答案解析】小儿遗尿之心肾失交证

证候: 梦中尿出, 寐不安宁, 易哭易惊, 白天多动少静, 记忆力差, 或五心烦热, 形体较瘦, 舌红少苔, 脉沉细而数。

治法：清心滋肾，安神固脬。

方药：交泰丸合导赤散加减。

48. 【正确答案】A

【答案解析】性早熟之阴虚火旺证。

证候：女孩乳房发育或伴其他性征及内外生殖器发育，甚者月经提前来潮；男孩睾丸容积增大（ $>4\text{ml}$ ），或伴喉结突出，变声，或有遗精。或伴有潮热、盗汗、五心烦热、便秘、舌红或舌尖红，少苔，脉细数。

治法：滋补肾阴，清泻相火。

方药：知柏地黄丸加减。

49. 【正确答案】A

【答案解析】小儿肺炎之风寒闭肺证。

证候：恶寒发热，无汗，呛咳不爽，呼吸气急，痰白而稀，口不渴，咽不红，舌质不红，舌苔薄白或白腻，脉浮紧，指纹浮红。

治法：辛温宣肺，化痰止咳。

方药：华盖散加减。

50. 【正确答案】B

【答案解析】消食导滞法主要适用于小儿饮食不节、乳食内滞之证。如积滞、疳证等。消乳化积常用消乳丸；消食化积常用保和丸；通导积滞常用枳实导滞丸、木香槟榔丸；健脾消食常用健脾丸等。

