

中级主管护师考试：《答疑周刊》2022年第22期

1. 【问题】常见几种混合液组成及张力？

【解答】

混合溶液	生理盐水	5%~10% 葡萄糖	1.4%碳酸氢钠 (1.87%乳酸钠)	张力	应用
1:1	1	1	-	1/2	轻、中度等 渗脱水
2:1	2	-	1	等张	低渗或重度 脱水
2:3:1	2	3	1	1/2	轻、中度等 渗脱水
4:3:2	4	3	2	2/3	中度、低渗 脱水
1:2	1	2	-	1/3	高渗性脱水
1:4	1	4	-【医学教育网原 创】	1/5	生理需要

2. 【问题】羊水胎粪污染的分度？

【解答】羊水胎粪污染可分为3度：I度为浅绿色；II度为黄绿色并浑浊；III度为棕黄色，稠厚。【医学教育网原创】

3. 【问题】各级护理人员编制基本标准？

【解答】

项目	标准		
	一级医院	二级医院	三级医院
总人员编制（床：职工）	1:（1~1.4）	1:1.4	1:1.6
卫生技术人员比例（%）	80	75	72~75
护理人员占卫技人员比例（%）	38	50	50
医师与护理人员之比	1:1（含医士）	1:2	1:2

病床与病房护理人员之比	—	不少于 1:0.4(300 床 以下不少于 1:0.3)	1:0.4
护师及以上业务职称人员比例 (占护理人员总数)(%)	$\geq 10$	$\geq 20$ 【医学教育网原创】	$\geq 30$
护理员占护理人员总数比例 (%)	$\leq 33$	$\leq 25$	$\leq 20$

4. 【问题】烧伤补液的计算公式?

【解答】我国常用的烧伤补液量计算公式：【医学教育网原创】伤后第一个 24 小时补液量按病人每千克体重每 1% 烧伤面积(Ⅱ~Ⅲ度)补液 1.5ml(小儿 1.8ml, 婴儿 2ml) 计算,【医学教育网原创】即第一个 24 小时补液量=体重(kg) × 烧伤面积(%) × 1.5ml, 另加每日生理需水量 2000ml, 即为补液总量。

