

2022 年妇产科主治医师必备考点 (61-70)

【考点 61】完全性前置胎盘

初次出血早，在妊娠 28 周左右，出血频繁，量较多，有时一次大量出血使患者陷入休克状态；边缘性前置胎盘初次出血较晚，多在妊娠 37~40 周或临产后，量较少；部分性前置胎盘初次出血时间和出血量在上述两者之间。

【考点 62】胎盘早剥的定义

妊娠 20 周后或分娩期，正常位置的胎盘在胎儿娩出前，部分或全部从子宫壁剥离，称胎盘早剥。

【考点 63】胎盘剥离的原因

孕妇腹部直接受撞击、摔倒腹部直接接触地、外倒转术矫正胎位、脐带绕颈，在分娩过程中胎先露部下降牵拉脐带、羊膜腔穿刺时刺破前壁胎盘附着处，血管破裂出血等引起胎盘剥离。

【考点 64】胎盘剥离主要病理变化

底蜕膜出血，形成血肿，使胎盘自附着处剥离。

【考点 65】胎膜早破的定义

胎膜在临产前破裂称胎膜早破。

【考点 66】最常见的妊娠合并心脏病

最常见的妊娠合并心脏病包括先天性心脏病、风湿性心脏病、妊娠期高血压性心脏病、围生期心肌病、贫血性心脏病以及心肌炎等。

【考点 67】心脏病孕产妇最危险的时期

妊娠 32~34 周、分娩期及产褥期最初 3 天内，心脏负担最重，是心脏病孕产妇最危险的时期。极易发生心力衰竭。

【考点 68】妊娠合并心脏病的处理

妊娠合并心脏病对不宜继续妊娠者，应于妊娠 12 周前行人工流产。超过 12 周者，终止妊娠必须行较复杂手术，其危险性不亚于继续妊娠和分娩。应与内科医师配合，密切监护，积极防治心力衰竭，必要时严密监护下剖宫取胎术。

【考点 69】协调性宫缩乏力的定义

协调性宫缩乏力（低张性宫缩乏力）：宫缩具有正常的节律性、对称性和收缩性，但收

缩力弱，持续时间短，间歇期长且不规律，多为继发性宫缩乏力。

【考点 70】不协调性宫缩乏力的定义

不协调性宫缩乏力（高张性宫缩乏力）：宫缩极性倒置，宫缩时宫底部不强，中段或下段强，宫缩间歇期宫壁不能完全松弛，表现为宫缩不协调，这种宫缩不能使宫口扩张，不能使胎先露部下降，属无效宫缩。

