

医学教育网主管护师:《答疑周刊》2023年第14期

问题索引:

1. 【问题】下肢静脉曲张的病因。
2. 【问题】支气管扩张症患者如何体液引流。
3. 【问题】终止妊娠的方法。
4. 【问题】何为左肺右体?

具体解答:


1. 【问题】下肢静脉曲张的病因。

【解答】下肢静脉曲张的病因有两类:

先天因素	例如静脉瓣膜缺陷、静脉壁薄弱等,与遗传有关
后天因素	比如长时间站立、重体力劳动、妊娠、肥胖、慢性咳嗽和习惯性便秘等引起的腹腔压力增高,使下肢静脉瓣膜承受过度压力

2. 【问题】支气管扩张症患者如何体液引流。

【解答】依病变部位不同,采取相应的体位,使病变部位处于高处,引流支气管开口向下。同时辅以拍背,以借重力作用使痰液流出。



3. 【问题】终止妊娠的方法。

【解答】

药物流产：适用于妊娠 7 周内者。

人工流产负压吸引术：适用孕 6~10 周以内。

人工流产钳刮术：适用孕 11~14 周者。

中期妊娠引产术常用于 15~24 周妊娠者。

4. 【问题】何为左肺右体？

【解答】左心衰时肺循环淤血，右心衰时体循环淤血，简称左肺右体。

体循环的路线为：左心室→主动脉→全身各级动脉→全身各处毛细血管→全身各级静脉→上、下腔静脉→右心房。

肺循环的路线为：右心室→肺动脉→肺部毛细血管→肺静脉→左心房。