

医学教育网主管护师：《答疑周刊》2024 年第 28 期

问题索引：

1. 【问题】阿托品化表现？阿托品中毒表现？
2. 【问题】直疝与斜疝的鉴别点是什么？
3. 【问题】老师，请总结一下关于瘫痪的类型。

具体解答：

1. 【问题】阿托品化表现？阿托品中毒表现？

【解答】阿托品化为：瞳孔较前扩大、颜面潮红、口干、皮肤干燥、肺部湿啰音减少或消失、心率加快等。当出现阿托品化，则应减少阿托品剂量或停药。

阿托品中毒表现：瞳孔扩大、烦躁不安、意识模糊、谵妄、抽搐、昏迷和尿潴留等，应及时停药观察，必要时使用毛果芸香碱进行拮抗。

2. 【问题】直疝与斜疝的鉴别点是什么？

【解答】

鉴别点	斜疝	直疝
发病年龄	多见于儿童及青壮年	多见于老年
突出途径	经腹股沟管突出，可进阴囊	由直疝三角突出，不进阴囊
疝块外形	椭圆或梨形，上部呈蒂柄状	半球形，基底较宽
回纳疝块后压住深环	疝块不再突出	疝块仍可突出
精索与疝囊的关系	精索在疝囊后方	精索在疝囊前外方
疝囊颈与腹壁下动脉的关系	疝囊颈在腹壁下动脉外侧	疝囊颈在腹壁下动脉内侧
嵌顿机会	较多	较少

3. 【问题】老师，请总结一下关于瘫痪的类型。

【解答】1) 单瘫：表现为一侧上肢或一侧下肢的运动不能或运动无力。见

于半球、脊髓前角、周围神经或肌肉等病变。

2) 偏瘫: 表现为一侧面部和肢体瘫痪, 常常见于一侧大脑半球病变, 如脑梗死等。

3) 交叉性瘫痪: 表现为病变侧脑神经麻痹和对侧肢体的瘫痪。常见于脑干病变。

4) 截瘫: 表现为双下肢瘫痪。多见于脊髓横贯性损害。

5) 四肢瘫: 表现为四肢不能运动或肌力减退。见于高位病变。

6) 局限性瘫痪: 表现为某一神经根支配区或某些肌群无力。

